

حمل الآن

مجاناً وحصرياً

المراجعة رقم (1)

اختبار شهر اكتوبر



أولاً : المراجعة النهائية

الغلاف المائي على كوكب الأرض

الوحدة الأولى
الدرس الأول

أولاً المصطلحات العلمية:

أولاً

المصطلح العلمي	التعريف
1- البيئة	نظام متكامل لا تنفصل مكوناته عن بعضها يضم عناصر فيزيائية وكيميائية وبيولوجية تتفاعل مع بعضها لتدعم استمرار الحياة على كوكب الأرض .
2- النظام البيئي	مجتمع من الكائنات الحية تتفاعل مع بعضها ومع المكونات غير الحية من أجل التكيف مع الظروف المتغيرة .
3- الغلاف المائي	غلاف يشمل جميع المسطحات المائية على كوكب الأرض مثل: البحيرات والبرك والأنهار والجداول والمحيطات، وغيرها .
4- الدورة الهيدرولوجية (دورة الماء)	الحركة المستمرة للماء من مكان إلى آخر خلال العديد من المسارات المختلفة حول الكرة الأرضية وفق نظام مغلق تقريباً .
5- عملية النتج	تخلص النبات من الماء الزائد على هيئة بخار ماء من سطح النبات المعرض للهواء .
6- الثغور	فتحات ميكروسكوبية موجودة في أسطح الأوراق والسيقان الخضراء .


ثانياً اذكر أهمية كل من:

1 عملية تسرب المياه من خلال مسام التربة	تكوين المياه الجوفية .
2 عملية التكثف	تساهم في تكوين السحب .
3 عملية النتج	خفض درجة حرارة النبات .
4 عملية الإخراج	تخلق قوة تسبب سحب الماء والأملاح إلى الأجزاء العليا عبر نسيج الخشب .
	التخلص من الفضلات الناتجة عن عمليات التمثيل الغذائي .


ثالثاً نسب هامة:

النسبة	المدلول
70 %	نسبة المياه على سطح الأرض .
30 %	نسبة اليابس على سطح الأرض .
97 %	نسبة المياه المالحة في المحيطات والبحار والبحيرات الملحية .
1 %	نسبة المياه العذبة السائلة في الأنهار والبحيرات والجداول والخزانات والمياه الجوفية الصالحة للاستهلاك البشري .
2 %	نسبة المياه العذبة الموجودة في صورة متجمدة في القمم الجليدية القطبية والأنهار الجليدية .

1 تتألف البيئة الطبيعية من أربعة أغلفة مترابطة، تتغير باستمرار وهي:



2 تشمل دورة الماء فى الطبيعة عدة عمليات منها:



المصطلحات العلمية:

أولاً

المصطلح العلمي	التعريف
1- الرابطة التساهمية	رابطة كيميائية تربط بين ذرتين عن طريق مشاركة كل ذرة إلكترون أو أكثر لتكوين الرابطة.
2- السالبية الكهربية	مقياس لقدرة الذرة على جذب إلكترونات الرابطة الكيميائية نحوها لفترة أطول.
3- الرابطة الهيدروجينية بين جزيئات الماء	تجاذب كهروستاتيكي بين ذرة الهيدروجين الموجبة جزئياً (δ^+) بأحد جزيئات الماء، وذرة الأكسجين السالبة جزئياً (δ^-) بجزء ماء مجاور.
4- التحلل المائي للأملاح (التميؤ)	تفاعل يحدث عند ذوبان ملح صلب في الماء مكوناً حمضاً وقاعدة أحدهما أو كلاهما ضعيف.
5- الرقم (الأس) الهيدروجيني pH	مقياس كمّي يعبر عن درجة حمضية أو قاعدية السوائل أو المحاليل، ويأخذ القيم من 14:0.

اذكر أهمية كل من:

ثانياً

السالبية الكهربية	تلعب دوراً هاماً في تحديد نوع المركب.
الرابطة الهيدروجينية للماء	تمنح الماء القدرة على إذابة الكثير من الأملاح وتفكيكها إلى أيونات متهدرتة.

علل لما يأتي:

ثالثاً

- 1 ارتفاع درجة غليان الماء.
بسبب وجود الروابط الهيدروجينية بين جزيئات الماء.
- 2 تجذب ذرة الأكسجين إلكترونات الرابطة الكيميائية نحوها في جزء الماء.
لكبر السالبية الكهربية لذرة الأكسجين مقارنة بذرة الهيدروجين.
- 3 لا يوجد الماء على سطح الأرض في صورة نقية.
لأنه يحتوي على العديد من الأيونات والمواد الكيميائية الذائبة أو التي تتفاعل معه بطرق مختلفة.
- 4 يعتبر الماء مذيئاً عاماً لمعظم المواد.
لقدرته على إذابة الكثير من المركبات الأيونية والمركبات التساهمية القطبية.
- 5 الماء النقي متعادل التأثير.
لتساوي تركيزات أيونات الهيدروجين الموجبة مع أيونات الهيدروكسيد السالبة.
- 6 لا يعتبر ذوبان كلوريد الصوديوم في الماء تحللاً مائياً.
لأن الأيونات الناتجة من تفكك الملح لا تتفاعل مع الماء لتكوين أحماض أو قواعد جديدة.
- 7 ملح كلوريد الأمونيوم NH_4Cl حامض التأثير.
لأنه يتحلل مائياً ويزداد تركيز أيونات الهيدروجين الموجبة ويقل تركيز أيونات الهيدروكسيد السالبة.

- 1 ارتباط جزيئات الماء مع بعضها بروابط هيدروجينية
ارتفاع درجة غليان الماء.
- 2 كبر السالبة الكهربائية لذرة الأكسجين مقارنة بذرة الهيدروجين.
يصبح جزيء الماء مركبًا قطبيًا.
- 3 إضافة مركب أيوني إلى الماء.
تتفكك الشبكة البلورية للمركب الأيوني إلى أيونات موجبة وسالبة، تحيط بها جزيئات الماء.
- 4 زيادة تركيز أيونات الهيدروجين H^+ عند التحلل المائي للملح.
يصبح محلول الملح حامضيًا وتكون قيمة pH أقل من 7.
- 5 زيادة تركيز أيونات الهيدروكسيد OH^- عند التحلل المائي للملح.
يصبح محلول الملح قاعديًا، وتكون قيمة pH أكبر من 7.
- 6 إذابة ملح بيكربونات الأمونيوم في الماء.
يظل تركيز أيونات الهيدروجين الموجبة H^+ مساويًا لتركيز أيونات الهيدروكسيد السالبة OH^- ، ويصبح محلول الملح متعادلًا.

خامسًا أهم المقارنات:

1 تقسيم الأملاح حسب تحللها المائي

الأملاح القاعدية

الأملاح المتعادلة

الأملاح الحمضية


عند إذابة الملح في الماء يتحلل مائيًا ويتسبب في:

زيادة تركيز أيونات الهيدروكسيد (OH^-) نقص تركيز أيونات الهيدروجين (H^+). مما يجعل محلول الملح قاعديًا .	ثبات تركيز أيونات الهيدروكسيد OH^- . ثبات تركيز أيونات الهيدروجين H^+ . مما يجعل محلول الملح متعادلًا .	نقص تركيز أيونات الهيدروكسيد OH^- . زيادة تركيز أيونات الهيدروجين H^+ . مما يجعل محلول الملح حمضيًا .
--	--	--

مثال:

$NaHCO_3$ إذابة ملح بيكربونات الصوديوم $NaHCO_3(s) + H_2O(l) \rightarrow Na^+(aq) + OH^-(aq) + H_2CO_3(aq)$	NH_4HCO_3 إذابة ملح بيكربونات الأمونيوم $NH_4HCO_3(s) + H_2O(l) \rightarrow H_2CO_3(aq) + NH_4OH(aq)$	NH_4Cl إذابة ملح كلوريد الأمونيوم $NH_4Cl(s) + H_2O(l) \rightarrow NH_4OH(aq) + H^+(aq) + Cl^-(aq)$
---	---	---


2 التركيب الكيميائي للماء




نسبة الهيدروجين	نسبة الأكسجين	الحجم
66.67%	33.33%	
حجم الهيدروجين : حجم الأكسجين 2 : 1		الكتلة
11.11%	88.89%	
كتلة الهيدروجين : كتلة الأكسجين 1 : 8		

سادساً أهم المخططات والأشكال:

1 الخواص الرئيسية للماء



2 الرقم الهيدروجيني



3 تقسيم المحاليل تبعاً لقيمة الرقم الهيدروجيني

المحلول الحمضي	المحلول المتعادل	المحلول القاعدي	النسبة بين تركيز أيونات H^+ وأيونات OH^- قيمة الـ (pH)
يكون تركيز H^+ > تركيز OH^-	يكون تركيز H^+ = تركيز OH^-	يكون تركيز H^+ < تركيز OH^-	
pH < 7	pH = 7	pH > 7	

المصطلحات العلمية:

أولاً

التعريف

- مواد قابلة للانسياب وتأخذ شكل الإناء الحاوى لها مثل السوائل والغازات.
- كتلة وحدة الحجم من المادة عند درجة حرارة معينة.
- النسبة بين كثافة مادة معينة إلى كثافة الماء النقي عند $4^{\circ}C$
- الطاقة التي تخزنها جزيئات الجسم نتيجة موضعها بالنسبة لبعضها البعض
- الطاقة التي تكتسبها جزيئات الجسم نتيجة حركتها.
- مجموع طاقتي الوضع والحركة لجزيئات أى جسم أو نظام.
- الطاقة المنتقلة من جسم - أو إليه أو خلاله - عند وجود فرق فى درجات الحرارة.
- وصف كمى لمدى سخونة أو برودة أى جسم أو نظام.
- أو: متوسط طاقة الحركة لجزيئات أى جسم أو نظام.
- كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة 1 kg من المادة درجة واحدة سيليزية أو كلفن واحد.
- الطاقة الحرارية التي تمتصها وحدة الكتل (1 kg) من المادة لتتحول من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية دون تغير فى درجة الحرارة.
- أو: الطاقة المنطلقة من المادة أثناء تحولها من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة دون تغير درجة الحرارة.

المصطلح العلمى

- 1- الموائع
- 2- الكثافة
- 3- الكثافة النسبية للمادة
- 4- طاقة الوضع
- 5- طاقة الحركة
- 6- الطاقة الداخلية للجسم أو النظام
- 7- كمية الحرارة
- 8- درجة الحرارة
- 9- الحرارة النوعية للمادة
- 10- الحرارة الكامنة للتصعيد

ثانياً اذكر أهمية كل من:

- قياس كثافة السوائل أو كثافتها النسبية.
- نقل الحرارة والملح من المناطق الاستوائية إلى قطبي الكرة الأرضية.
- نقل العناصر الغذائية من أعماق المحيط إلى السطح.
- نقل المياه العذبة التي تصب من الأنهار أو الانهار الجليدية المنصهرة إلى أماكن مختلفة حول العالم.
- تحمي أجسام الكائنات المائية التي تعيش فى هذه المناطق من التجمد والمحافظة على حياتها.

1 جهاز الهيدروميتر:

2 التيارات المائية العمودية.

3 الطبقة العازلة من الجليد على المياه السطحية فى المناطق القطبية.

ثالثاً أهم التعليقات:

- 1 يطفو الجليد فوق سطح الماء.
لأن الجليد (الثلج) أقل كثافة من الماء.
- 2 تستطيع الكائنات البحرية العيش تحت الجليد في المناطق القطبية.
لأن الجليد يطفو على سطح الماء ويكون طبقة عازلة لا تسمح بتجمد الماء الموجود تحتها، وبالتالي تستطيع الكائنات البحرية العيش في هذه المياه.
- 3 يتميز الماء بارتفاع حرارته النوعية مقارنة بباقي المواد.
بسبب وجود الروابط الهيدروجينية بين جزيئات الماء.
- 4 تعمل البحار والمحيطات كخزانات حرارية ضخمة.
بسبب ارتفاع الحرارة النوعية للماء، مما يؤدي إلى امتصاص المياه كميات كبيرة من الطاقة الشمسية أثناء النهار دون أن ترتفع درجة حرارتها بشكل كبير، ولذلك يحتفظ الماء بدرجة حرارة ثابتة نسبياً.
- 5 تسخن اليابسة أسرع من الماء عند تعرضهما لنفس كمية الإشعاع الشمسي.
لأن الحرارة النوعية لليابسة أقل من الماء، فتسخن بدرجة أكبر من الماء.
- 6 تحتاج المواد المختلفة إلى كميات مختلفة من الحرارة لرفع درجة حرارتها بنفس المقدار.
لاختلاف الحرارة النوعية لكل مادة عن الأخرى.
- 7 ثبات درجة حرارة جسم الإنسان حتى في البيئات الباردة.
لأنه من الكائنات ذوات الدم الدافئ التي تستطيع الحفاظ على درجة حرارة ثابتة داخل أجسامها من خلال عمليات الأيض، بغض النظر عن درجة حرارة البيئة المحيطة.
- 8 تستخدم الكائنات الحية التبخر كآلية لتنظيم درجة حرارة أجسامها.
لأن جزيئات الماء المتبخرة تحمل الحرارة بعيداً عن الجسم.
- 9 يتميز الماء بأن له حرارة كامنة مرتفعة.
لوجود الروابط الهيدروجينية الموجودة بين جزيئات الماء.
- 10 حدوث ظاهرة نسيم البحر.
لاختلاف الحرارة النوعية للماء عن اليابسة؛ ولذلك يتحرك الهواء البارد (الأكثر كثافة) من فوق سطح الماء في اتجاه اليابس ليحل محل الهواء الساخن (الأقل كثافة).
- 11 تزداد كثافة الماء بمقدار طفيف في الأعماق الكبيرة من المحيطات.
لزيادة الضغط وتقارب جزيئات الماء من بعضها أكثر، فيقل الحجم وتزداد الكثافة بمقدار طفيف.
- 12 تقل كثافة الماء عند ارتفاع درجة حرارته عن 4°C .
لتباعد جزيئات الماء عن بعضها، فيتمدد الماء ويزداد حجمه وبالتالي تقل كثافته.
- 13 تنخفض درجة حرارة اليابسة بسرعة أكبر من الماء عند غروب الشمس.
لأن الحرارة النوعية لليابسة أقل من الحرارة النوعية للماء، فتفقد حرارتها بسرعة.
- 14 تعتمد الكائنات ذوات الدم البارد على مصادر خارجية لتنظيم حرارة أجسامها.
لأن درجة حرارة أجسامها تتغير بتغير درجة حرارة البيئة المحيطة.

رابعاً ما النتائج المترتبة على...؟

- 1 زيادة ملوحة المياه في المحيطات بالنسبة لكثافة الماء.
تزداد كثافة الماء.
- 2 ارتفاع درجة حرارة الماء من 0°C إلى 4°C بالنسبة لحجم وكثافة الماء.
يقل حجم الماء وتزداد كثافته.

3 ارتفاع درجة حرارة الماء أعلى من 4°C بالنسبة لحجم وكثافة الماء.

يزداد حجم الماء وتقل كثافته.

4 اكتساب جسم أو نظام كمية من الطاقة الحرارية.

تزداد سعة اهتزاز جزيئاته وطاقة حركتها، وبالتالي تزداد الطاقة الداخلية له وترتفع درجة حرارته.

5 اختلاف الحرارة النوعية للماء عن اليابسة.

حدوث ظاهرة نسيم البحر واعتدال المناخ بالقرب من المسطحات المائية الكبيرة.

6 تغير المناخ وارتفاع درجة الحرارة بالنسبة للشعاب المرجانية.

قد يؤدي إلى موت الشعاب المرجانية التي تحتاج إلى درجات حرارة محددة من أجل البقاء.

7 ارتفاع الحرارة النوعية لمادة معينة.

تحتاج إلى اكتساب كمية أكبر من الحرارة لرفع درجة حرارتها بمقدار 1 K

خامساً أهم المخططات:



سادساً أهم القوانين والمسائل:

$$1 \text{ الكثافة النسبية للمادة} = \frac{\text{كثافة المادة}}{\text{كثافة الماء النقي}}$$

احسب الكثافة النسبية لمادة ما، إذا كانت كثافتها تساوي 4.8 g/cm^3 علماً بأن كثافة الماء النقي 1 g/cm^3

الحل

$$4.8 = \frac{4.8}{1} = \frac{\text{كثافة المادة}}{\text{كثافة الماء النقي}} = \text{الكثافة النسبية للمادة}$$

2 حساب كمية الحرارة التي يفقدها أو يكتسبها الجسم :

$$Q_{th} = m c \Delta t$$

 Q_{th}

كمية الحرارة وتقاس
بوحدة الجول J

 m


كتلة الجسم وتقاس
بوحدة الكيلوجرام kg

 c

الحرارة النوعية للمادة
وتقاس بوحدة
 $J/kg \cdot ^\circ C$ أو $J/kg \cdot K$

 Δt

مقدار التغير في درجة
حرارة الجسم
 $^\circ C$ أو K



احسب كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة 0.5 kg من النحاس من 30 درجة سيليزية إلى 80 درجة سيليزية علماً بأن الحرارة النوعية للنحاس $390 \text{ J/kg} \cdot K$

الحل

$$m = 0.5 \text{ kg} \quad c = 390 \text{ J/kg} \cdot K \quad \Delta t = 80 - 30 = 50 \text{ } ^\circ C$$

$$Q_{th} = m c \Delta t = 0.5 \times 390 \times 50 = 9750 \text{ J}$$

تطبيق الأضواء مجاناً

أدخل كودك الشخصي الموجود في الغلاف
الداخلي في نهاية الكتاب واستخدم
تطبيق الأضواء مجاناً.

نزل التطبيق أو ادخل على موقع الأضواء:
www.aladwaa.com



التعريف

المصطلح العلمي

خليط متجانس يتكون من مذيب ومذاب.	1- المحلول
المادة التي توجد في المحلول بكمية أكبر.	2- المذيب
المادة التي تذوب في المذيب وتوجد في المحلول بكمية أقل.	3- المذاب
خواص المحلول التي تعتمد على عدد جزيئات أو أيونات المذاب غير المتطايرة، وليس على نوعه.	4- الخواص الجمعية للمحاليل
حالة يصل إليها السائل في إناء مغلق عندما يتساوى معدل التبخر مع معدل التكثف عند درجة حرارة معينة.	5- الاتزان الديناميكي
الضغط الذي يحدثه بخار السائل عند الاتزان الديناميكي على سطح السائل في إناء مغلق عند درجة حرارة معينة.	6- الضغط البخاري
درجة الحرارة التي يتساوى عندها الضغط البخاري للسائل مع الضغط الجوي عند سطح السائل.	7- درجة الغليان
درجة الحرارة التي يبدأ عندها السائل التحول من حالته السائلة إلى حالته الصلبة عند درجة حرارة معينة.	8- درجة التجمد
الضغط الناشئ في المحلول لاختلاف تركيز المادة المذابة بين أجزائه.	9- الضغط الأسموزي
ظاهرة انتقال الماء من المحلول المخفف إلى المحلول المركز خلال غشاء شبه منفذ يفصل بين محلولين.	10- الأسموزية

أهم التعليقات:

ثانياً

- الماء في المسطحات المائية ليس نقيًا. لأنه يحتوي على عدة مواد ذائبة أو عالقة تؤثر على خواصه، وبالتالي على تنوع الكائنات الحية فيه.
- الضغط البخاري للمحلول المائي أقل من الضغط البخاري للماء النقي. لأن جزيئات أو أيونات المذاب تشغل جزءًا من سطح السائل فتقلل جزيئات الماء المعرضة للتبخر.
- درجة غليان المحاليل المائية أعلى من درجة غليان الماء النقي. لأن وجود المذاب يقلل الضغط البخاري للمحلول مما يتطلب طاقة أكبر للوصول إلى ضغط بخاري يساوي الضغط الجوي.
- درجة غليان الماء النقي ثابتة. لعدم وجود جزيئات مذابة فيه تغير من ضغطه البخاري.

- 5 درجة تجمد المحاليل المائية أقل من درجة تجمد الماء النقي.
- لأن وجود أيونات أو جزيئات المذاب يعوق ارتباط جزيئات الماء ببعضها في شكل بلورات الثلج.
- 6 ترش كميات من الملح على الطرق في المناطق الباردة بعد سقوط الأمطار.
- حتى يتحول ماء المطر لمحلول ملحي فتتخفض درجة تجمده مما يساعد في منع انزلاق السيارات وتقليل الحوادث.
- 7 يزداد الضغط الأسموزي بزيادة تركيز المواد المذابة.
- لأن المحلول الأعلى تركيزاً يكون له قدرة سحب أكبر للماء عبر الغشاء شبه المنفذ.

ثالثاً ما النتائج المترتبة على...؟

- 1 الارتفاع عن سطح البحر بالنسبة لدرجة غليان الماء.
- تقل درجة غليان الماء.
- 2 إذابة مادة غير متطايرة في الماء بالنسبة للضغط البخاري للمحلول.
- ينخفض الضغط البخاري للمحلول عن الماء النقي.
- 3 تساوى معدل تبخر السائل مع معدل تكثف البخار في نظام مغلق.
- حدوث حالة الاتزان الديناميكي وثبات كمية كل من السائل والبخار.

رابعاً أهم المقارنات:

1- الماء النقي والمحلول المائي

وجه المقارنة	الماء النقي	المحلول المائي
الضغط البخاري	أعلى (لزيادة عدد جزيئات الماء المعرضة للتبخر)	أقل (لنقص عدد جزيئات الماء المعرضة للتبخر، حيث إن جزيئات أو أيونات المذاب تشغل جزءاً من السطح)
درجة الغليان	ثابتة عند 100°C تحت الضغط الجوي المعتاد	أعلى (لأنه يحتاج طاقة أكبر للوصول إلى ضغط بخاري يساوي الضغط الجوي)
درجة التجمد	ثابتة (عند 0°C)	أقل (لأن وجود المذاب يعوق ارتباط جزيئات الماء في شكل بلورات الثلج)
الضغط الأسموزي	ليس له ضغط أسموزي لأنه لا يحتوي على مواد مذابة	له ضغط أسموزي يزداد بزيادة تركيز المذاب

2- درجة الغليان ودرجة التجمد

درجة الغليان	درجة التجمد
التعريف	الدرجة التي يبدأ عندها السائل بالتحول من حالته الصلبة إلى حاله سائلة عند درجة حرارة معينة
تأثير وجود المذاب	يرفع درجة الغليان
السبب	يقلل الضغط البخاري فيحتاج طاقة أكبر


1 علاقة طردية

كمية الحرارة اللازمة للتغلب على قوى التجاذب وتحرر جزيئات الماء في صورة بخار	علاقة طردية	قوى التجاذب بين جزيئات الماء أو بين جزيئات المذاب وجزيئات الماء
ضغط بخار السائل		جزيئات الماء المعرضة للتبخر
الضغط الأسموزي		تركيز المذاب
درجة الغليان		الضغط الجوي

2 علاقة عكسية:

عدد جزيئات أو أيونات المذاب في المحلول	علاقة عكسية	الضغط البخاري
درجة الغليان		الضغط البخاري

سادسًا أهم المخططات والرسومات:



المصطلحات العلمية:

أولاً

المصطلح العلمي	التعريف
1- الخلية	الوحدة الأساسية للحياة، قادرة على القيام بجميع الأنشطة الحيوية أو الوحدة التركيبية والوظيفية لجميع الكائنات الحية.
2- كائنات بدائية النواة	كائنات وحيدة الخلية لا تحاط مادتها الوراثية بغشاء نووى ولها جدار خلوى يحتوى على مادة (ببتيدوجليكان) يمنحها الشكل والصلابة.
3- كائنات حقيقية النواة	كائنات تحاط مادتها الوراثية بغشاء نووى وتحتوى خلاياها على عضيات متخصصة مثل الميتوكوندريا والبلاستيدات.
4- جدار الخلية	جدار سليلوزى سميك يحيط بالخلايا النباتية والفطريات من الخارج، ويحدد لها شكلها ويحميها ويغلف مكوناتها.
5- غشاء الخلية (الغشاء البلازمى)	غشاء رقيق شبه منفذ يحيط بالخلية يفصل بين محتويات الخلية والوسط المحيط بها.
6- السيتوبلازم	مادة هلامية يتكون معظمها من الماء تسبح فيه عضيات الخلية.
7- النواة	جسم كروى أو بيضاوى الشكل توجد فى الخلايا النباتية والحيوانية و غالباً ما تكون مركزية فى الخلايا الحيوانية.
8- البلاستيدات الخضراء	إحدى عضيات الخلية توجد فى الخلايا النباتية فقط وتحتوى على مادة الكلوروفيل (chlorophyll).
9- الشبكة الإندوبلازمية	مجموعة من الأغشية توجد بالقرب من نواة الخلية.
10- عمليات الأيض (التمثيل الغذائى)	مجموعة التفاعلات البيوكيميائية المستمرة التى تحدث فى خلايا الكائن الحى للاستفادة من الغذاء المهضوم للحفاظ على الحياة.
11- عملية الهدم	العملية التى يتم فيها تكسير الروابط الكيميائية بين ذرات الجزيئات المعقدة لإطلاق الطاقة الكيميائية المخزنة فيها.
12- عملية البناء	العملية التى يتم فيها بناء جزيئات كبيرة ومعقدة من جزيئات بسيطة مع استهلاك طاقة.
13- الإنزيمات	مواد منشطة أو محفزة تزيد من سرعة التفاعلات الكيميائية، عن طريق خفض طاقة التنشيط اللازمة لبدء التفاعل.
14- طاقة التنشيط	الحد الأدنى من الطاقة اللازم لبدء التفاعل الكيميائى.

ثانياً اذكر أهمية كل من:

- 1 جدار الخلية: يحدد شكل الخلايا النباتية ويغلف مكوناتها ويحميها.
- 2 غشاء الخلية (الغشاء البلازمي): حماية محتويات الخلية الداخلية وتنظيم مرور المواد من وإلى الخلية.
- 3 السيتوبلازم: يحتوى على بعض المواد الكيميائية المهمة لبقاء الخلية حية.
- 4 النواة: تحتوى على المادة الوراثية التى تحدد صفات الكائن الحى وتتحكم بأنشطة الخلية.
- 5 البلاستيدات الخضراء: تحتوى على مادة الكلوروفيل وتتم فيها عملية البناء الضوئى.
- 6 الفجوة العصارية: تخزن الماء والغذاء والأملاح الزائدة فى الخلية.
- 7 الميتوكوندريا: مراكز إنتاج الطاقة فى الخلية.
- 8 الشبكة الإندوبلازمية: نقل المواد المختلفة من مكان إلى آخر داخل الخلية.


ثالثاً أهم التعليقات:

- 1 الماء ضرورى لحياة الكائنات الحية.
- 2 لأنه يمتلك خواص فريدة تعتمد عليها العمليات الحيوية فى جميع خلايا الكائنات الحية.
- 3 يساهم الماء فى الحفاظ على درجة حرارة أجسام الكائنات الحية مستقرة.
- 4 لارتفاع حرارته النوعية، مما يُمكن الكائنات الحية من الحفاظ على درجة حرارتها الداخلية ثابتة رغم التقلبات الخارجية.
- 5 عدم قدرة الأوليات الحيوانية على تكوين غذائها بنفسها.
- 6 لأنها غير ذاتية التغذية.
- 7 تصنف الضفادع على أنها من الفقاريات.
- 8 لأنها تحتوى على عمود فقري.
- 9 يمكن تشبيه الميتوكوندريا بجذر البطارية.
- 10 لأنها تعتبر مصدر إنتاج الطاقة داخل الخلية.
- 1 يتوقف انتقال المواد من الخلية بغياب الشبكة الإندوبلازمية.
- 2 لأن الشبكة الإندوبلازمية مسئولة عن نقل المواد داخل الخلية.
- 3 يُعد الماء عاملاً أساسياً فى الحفاظ على التوازن الداخلى.
- 4 لأنه يشارك بشكل مباشر فى عمليات الأيض (التمثيل الغذائى)، والتى تتوقف عليها حياة الكائن الحى.
- 5 تعمل الإنزيمات على خفض طاقة التنشيط.
- 6 لأنها مواد بروتينية محفزة تزيد من سرعة التفاعلات الكيميائية عن طريق خفض الحد الأدنى من الطاقة اللازم لبدء التفاعل (طاقة التنشيط) إلى مستويات مناسبة لدرجة حرارة الجسم.
- 7 يقل نشاط الإنزيم تدريجياً أو يتوقف بالكامل إذا تغيرت درجة الحرارة أو الحموضة المثالية.
- 8 لأن لكل إنزيم درجة حرارة ورقم هيدروجينى (pH) أمثل يعمل عندهما بأقصى فاعلية. وإذا ابتعدت القيم عن هذه المستويات المثالية، فإن كفاءة الإنزيم تقل حتى يتوقف عن العمل تماماً
- 9 يمكن تشبيه الإنزيم بالقفل ومادة التفاعل بالمفتاح.
- 10 لأن الإنزيمات تعمل من خلال آلية «القفل والمفتاح»، حيث يرتبط الموقع النشط للإنزيم بشكل خاص بمادة التفاعل التى يؤثر عليها، مما يضمن تحويلها إلى نواتج بكفاءة عالية.

1- تقسيم الكائنات الحية:



2- تركيب الخلية النباتية والخلية الحيوانية



3- أهمية الماء للكائن الحي

أهمية الماء للكائن الحي

- | | | | |
|---|---|--|---|
| 1- يعمل كمذيب عام يسمح بحدوث التفاعلات الكيميائية الحيوية من خلال إذابة الأملاح والعناصر الغذائية وحمل الغازات. | 2- المكون الأساسي للسيتوبلازم، وبالتالي يمكن للخلية الحفاظ على شكلها وبنيتها. | 3- الحفاظ على درجات حرارة داخلية مستقرة داخل أجسام الكائنات الحية. | 4- الحفاظ على التوازن الداخلي ودعم الأنشطة الكيميائية المعقدة للحياة. |
|---|---|--|---|

4- خصائص الإنزيمات:

2- لكل إنزيم درجة حرارة مناسبة ودرجة

حموضة مثالية (HP)

- يعمل عندها بأقصى فاعلية ويقل نشاط الإنزيم تدريجياً حتى يتوقف بالكامل عند الزيادة أو النقصان عن هذه القيم المثالية.

1- الإنزيمات بروتينات متخصصة

- تعمل من خلال آلية تسمى (القفل والمفتاح)؛ حيث يرتبط الموقع النشط للإنزيم تحديداً بالمادة التي يؤثر عليها الإنزيم (مادة التفاعل).

أهم المقارنات:

رابعاً

عملية الهدم وعملية البناء:

عملية البناء

العملية التي يتم فيها بناء جزيئات كبيرة ومعقدة من جزيئات بسيطة مع استهلاك طاقة.

عملية البناء الضوئي وعملية بناء البروتينات من الأحماض الأمينية.






عملية الهدم

العملية التي يتم فيها تكسير الروابط الكيميائية بين ذرات الجزيئات المعقدة لإطلاق الطاقة الكيميائية المخزنة فيها.

تكسير سكر الجلوكوز أثناء التنفس الخلوي إلى ثاني أكسيد الكربون وماء لإنتاج الطاقة.



كيفية طباعة صفحات معينة من ملف معين مثلا ازاي نطبع الصفحات من صفحة 4 الى صفحة 9



حمل الآن

مجاناً وحصرياً

المراجعة رقم (2)


اختبار شهر اكتوبر



أولاً: اختر الإجابة الصحيحة:

1 الشكل المقابل يوضح فتحات ميكروسكوبية بورقة نبات ما في أوقات مختلفة من اليوم ، ادرسه ثم حدد: أى مما يلي

صحيح؟



(أ) الثغور (1) يساعد على حدوث عملية النتح أثناء الليل

(ب) الثغور (2) يساعد على حدوث عملية التنفس أثناء النهار


(ج) الثغور (1) يساعد على حدوث عملية النتح أثناء النهار

(د) الثغور (1 ، 2) ليس لهما أهمية في عملية النتح

2 تشارك الكائنات الحيوانية في دورة الماء الهيدرولوجية من خلال عملية

(أ) الإخراج والتنفس معاً (ب) النتح (ج) البناء الضوئي (د) كل ما سبق

3 أى مما يلي لا يمثل البيان (س)؟



(أ) يمثل نوعاً من التجاذب الكهروستاتيكي

(ب) يمثل نوعاً من مشاركة إلكترونات التكافؤ

(ج) يمثل نوعاً من الروابط التساهمية

(د) رابطة لا توجد بين جزيئات الماء

4 تصل درجة غليان كبريتيد الهيدروجين إلى 61°C - وذلك بسبب

(أ) وجود روابط هيدروجينية بين جزيئاته

(ب) نقص الكتلة الجزيئية


(ج) عدم وجود روابط هيدروجينية بين جزيئاته

(د) لا يوجد إجابة صحيحة

5 النسبة بين عدد الروابط التساهمية والروابط الهيدروجينية لجزيء الماء الواحد تساوى

(أ) 2 : 1 (ب) 1 : 2 (ج) 4 : 1 (د) 1 : 1

6 يمكن التعبير عن العلاقة بين وجود الروابط الهيدروجينية والحرارة النوعية من خلال الشكل



7 تقوم البكتيريا بتدعيم جدارها الخلوى بمادة

(أ) البكتين (ب) الكيوتين (ج) الببتيدوجليكان (د) اللجنين

8 كل الكائنات التالية تستطيع تنظيم درجة حرارة أجسامها ما عدا



د



ج



ب



أ

9 بفحص خلية تحت الميكروسكوب لوحظ وجود مادة الكيتين في جدارها ، مما يؤكد أنها خلية ل.....

(أ) نجم البحر (ب) طحلب ذهبي (ج) فطر الخميرة (د) جلد إنسان

10 أى الكائنات التالية تشترك في وجود غشاء نووى حول مادتها الوراثية ؟

(أ) الطحالب الذهبية وفطر الخميرة

(ب) فطر الخميرة وبكتيريا النوستوك

(ج) الثدييات وبدائيات النواة

(د) البكتيريا والفطريات

11 عند مقارنة قطعة من الألومنيوم كتلتها 270 g وحجمها 100 cm^3 ، وأخرى من الخشب كتلتها 80 g وحجمها

100 cm^3 ، أى المادتين لها كثافة نسبية أكبر؟

(أ) الألومنيوم (ب) الخشب (ج) كلاهما متساويان (د) لا يمكن التحديد

12 إذا كانت الحرارة النوعية للمادة (أ) أعلى من الحرارة النوعية للمادة (ب) ، فماذا يمكن أن نستنتج من سلوك هاتين

المادتين عند رفع درجة حرارتهما ؟

(أ) المادة (أ) ستسخن أبطأ من المادة (ب) (ب) ستسخن المادتان بنفس السرعة

(ج) هذا العامل لن يؤثر في سرعة التسخين (د) المادة (أ) ستسخن أسرع من المادة (ب)

ثانيًا: المقالى

1 قطعة من الحديد كتلتها 300 g وكانت درجة حرارتها 27°C ، اكتسبت كمية من الحرارة قيمتها 5000 J ، فما هى

درجة حرارتها النهائية ؟ (علمًا بأن : الحرارة النوعية للحديد = 450 J/kg.K)

الإجابة:

.....

.....

.....

.....

2 ما النتائج المترتبة على ارتفاع درجة حرارة الجسم بالنسبة لنشاط الإنزيمات ؟

الإجابة:

3 لماذا يلجأ الضفدع للاختباء داخل الماء أثناء فترة البيات الشتوى ؟

الإجابة:



أولاً: اختر الإجابة الصحيحة:

1 كل مما يلي يصلح لرى التربة الزراعية ما عدا

- (أ) المياه الجوفية (ب) الجداول (ج) المحيطات (د) الأنهار


2 الرسم المقابل يوضح عملية النتح في أحد النباتات ، أى البيانات التالية يعبر عن الماء في حالته البخارية ؟

A (أ)

B (ب)

C (ج)

(د) لا توجد إجابة صحيحة



3 أى نوع من الأملاح ينتج محلولاً متعادلاً عند ذوبانه في الماء ؟

(أ) كلوريد الأمونيوم

(ب) بيكربونات الصوديوم

(ج) كلوريد الصوديوم

(د) بيكربونات الأمونيوم

4 الخاصية الكيميائية التى تساعد على انتقال الفضلات من الخلايا تشير إلى أن الماء

(أ) مذيب قطبى عام

(ب) كثافته منخفضة

(ج) حرارته النوعية مرتفعة

(د) درجة تجمده مرتفعة

5 فى الشكل المقابل ، يوجد عدة أواني طهى على ارتفاعات مختلفة تحتوى على كمية متساوية من الماء ، أى الخيارات التالية


”من اليمين لليسار“ يرتب درجة غليان الأواني الثلاثة تنازلياً ؟

X ، Y ، Z (أ)

Y ، X ، Z (ب)

Z ، Y ، X (ج)

X ، Z ، Y (د)



6 مادتان مختلفتان (Y, X) لهما كتلتان متساويتان ، تم إكسابهما نفس كمية الحرارة فارتفعت درجة حرارة X بمقدار 10 °C وارتفعت درجة حرارة Y بمقدار 5 °C ، فهذا يعني أن

(قنا ٢٠٢٥)

(أ) الحرارة النوعية لمادة X = $\frac{1}{5}$ الحرارة النوعية لمادة Y

(ب) الحرارة النوعية لمادة X = ضعف الحرارة النوعية لمادة Y

(ج) الحرارة النوعية لمادة X = نصف الحرارة النوعية لمادة Y

(د) الحرارة النوعية لمادة X = الحرارة النوعية لمادة Y

(القليوبية ٢٠٢٥)

7 إذا زادت كمية الحرارة التي يكتسبها جسم إلى الضعف فإن حرارته النوعية

(أ) تزيد للضعف (ب) تقل للنصف (ج) تظل ثابتة (د) تقل للربع

8 أى المواد التالية تمتلك حرارة نوعية أعلى؟

(أ) الجليد (ب) الماء السائل (ج) الحديد (د) الرصاص

9 أى من التالى يعبر عن البيان (س) ؟

(أ) تحاط مادتها الوراثية بغشاء نووى

(ج) كائنات ذاتية التغذية

(ب) كائنات عديدة الخلايا

(د) كائنات غير ذاتية التغذية

10 كل الكائنات التالية تمتلك خلاياها جدارًا خلويًا ما عدا

(أ) نبات الفول

(ج) فطر الخميرة

(ب) البكتيريا

(د) الحشرات

11 إذا كانت الكثافة النسبية لمادة تساوى 1.6 وحجم مكعب من هذه المادة 250 cm³ ، فإن كتلة المكعب تساوى

(أ) 200 g (ب) 250 g (ج) 300 g (د) 400 g

12 أى من درجات الحرارة التالية يكون متوسط طاقة حركة جزيئات المادة فيها أكبر ما يمكن ؟

(أ) 0 °C (ب) 273 °C (ج) - 273 °C (د) 100 °C


ثانياً: الأسئلة المقالية:

1 علل : الإنزيمات ضرورية للعمليات الحيوية.

الإجابة:

.....

.....



2 من الشكل المقابل أجب عن التالي:

أ ما اسم العملية الموضحة بالشكل؟

ب ما هي أهميتها للنبات؟

الإجابة:

3 قطعة من الحديد كتلتها 0.5 kg ودرجة حرارتها 10°C ، ما هي درجة الحرارة التي تصل إليها عندما تكتسب

كمية من الحرارة مقدارها 1155 J ؟ (علمًا بأن الحرارة النوعية للحديد 450 J/kg.K)

الإجابة:

1 توقف عملية النتح في النباتات سيؤثر بشكل مباشر على

(أ) انخفاض ملوحة المحيطات

(ب) تناقص بخار الماء في الجو

(ج) زيادة معدلات الأمطار

(د) ثبات دورة الكربون


2 أى العمليات التالية تسهم في نقل الماء من الغلاف المائى إلى الغلاف الصخرى؟

(أ) الترسيب (ب) التسرب (ج) التبخر (د) النتح

3 نوع المحلول الناتج عن ذوبان المركب في الشكل المقابل

(أ) متعادل (ب) متردد

(ج) حامضى (د) قاعدى



4 عند إضافة كلوريد الصوديوم في الماء ، تحاط أيونات الكلوريد السالبة بـ

(أ) الشحنات السالبة الجزئية للهيدروجين

(ب) الشحنات السالبة الجزئية للأكسجين

(ج) الشحنات الموجبة الجزئية للأكسجين

(د) الشحنات الموجبة الجزئية للهيدروجين

5 أى العوامل التالية تسبب تكوين التيارات البحرية العمودية؟

(أ) الكثافة والملوحة فقط

(ب) الضغط والحرارة فقط

(ج) الكثافة ودرجة الحرارة والملوحة

(د) الملوحة والضغط دون حرارة


6 من الشكل المقابل ، ما الذى يعبر عنه التركيب (س) ؟

(أ) غشاء الخلية

(ب) جدار خلوى

(ج) بلاستيدة خضراء

(د) كل ما سبق



7 كمية معينة من مادة ارتفعت درجة حرارتها من 30°C إلى 310K ، فإن التغير في درجة الحرارة يساوي.....

- (أ) 7K (ب) 37°C (ج) 280K (د) 280°C

8 بقاء درجة حرارة الماء ثابتة رغم اكتسابه حرارة أثناء الغليان يعكس خاصية

- (أ) الحرارة النوعية (ب) الحرارة الكامنة للانصهار
(ج) الحرارة الكامنة للتصعيد (د) السعة الحرارية الكلية

9 عند صعود الهواء الدافئ إلى أعلى يبرد ويتمدد، مما يؤدي إلى حدوث

- (أ) التكاثف (ب) الاتزان الحراري (ج) التوصيل (د) الحمل الحراري

10 أي العضيات التالية مسئولة عن التخزين في الخلية ؟



11 جسم كثافته النسبية 0.7، تم وضعه في الماء. السلوك المتوقع للجسم هو

- (أ) لا يطفو فوق سطح الماء (ب) يغوص إلى القاع
(ج) يبقى معلقاً في منتصف عمود الماء (د) يطفو جزئياً ويغمر جزء صغير منه

12 درجة غليان الماء النقي H_2O أعلى من درجة غليان كبريتيد الهيدروجين H_2S بمقدار

- (أ) 100°C (ب) -61°C (ج) 39°C (د) 161°C

ثانيًا: الأسئلة المقالية:

1 قارن بين كمية الحرارة ودرجة الحرارة من حيث (المفهوم ، وحدة القياس)

كمية الحرارة	درجة الحرارة
.....	
.....	
.....	
.....	

2 علل : وجود الماء ضروري لاستمرار الحياة في الكائنات الحية.

الإجابة:

3 ما هي كتلة قطعة من الحديد يلزم لرفع درجة حرارتها من 15°C إلى 25°C ، عند اكتساب كمية من الحرارة تقدر بـ 1800 J والحرارة النوعية للحديد تساوي 450 J/kg.K ؟

الإجابة:

أولاً: اختر الإجابة الصحيحة:

1 تعتبر الأنهار الجليدية جزءاً من دورة الماء؛ لأنها

- (أ) تعمل كخزان مؤقت للماء العذب
- (ب) تزيد من ملوحة البحار
- (ج) تنقل الأملاح إلى اليابس
- (د) تقلل من التبخر

2 زيادة التبخر من سطح المحيطات دون تعويض بالتساقط تؤدي إلى تغير ملحوظ في

- (أ) شدة الضوء
- (ب) ملوحة المياه
- (ج) الضغط المائي
- (د) الحرارة النوعية

3 عند إذابة بيكربونات الأمونيوم في الماء فمن المتوقع أن درجة pH تساوى تقريباً


- (أ) 2
- (ج) 4.8
- (ج) 12
- (د) 7

4 عند مقارنة الماء مع كبريتيد الهيدروجين، فإن الفرق في درجة الغليان يرجع أساساً إلى

- (أ) الكتلة الجزيئية
- (ب) الروابط الهيدروجينية
- (ج) الحرارة النوعية
- (د) الكثافة النسبية

5 أى العبارات التالية صحيحة عن الشكل المقابل؟

- (أ) الهواء س أكبر في الكثافة من الهواء ص
- (ب) الهواء ص أكبر في الكثافة من الهواء س
- (ج) الهواء س و ص متساويان في الكثافة
- (د) الهواء ص أقل في الكثافة من الهواء س



6 جسمان أ، ب من نفس المادة وكتلتهما X_1 ، X_2 على الترتيب، واكتسب الجسمان كمية من الحرارة مقدارها Z

وارتفعت الحرارة بمقدار 20°C ، 25°C على الترتيب، فإن النسبة بين كتلتى الجسمين $\frac{X_1}{X_2}$ تساوى

- (أ) $\frac{1}{2}$
- (ب) $\frac{5}{4}$
- (ج) $\frac{2}{1}$
- (د) $\frac{4}{3}$

7 عند قياس درجة حرارة جسم باستخدام الترمومتر، فإن القراءة تعكس

- (أ) الطاقة الداخلية الكلية للجسم
- (ب) معدل انتقال الطاقة الحرارية منه
- (ج) متوسط طاقة حركة جزيئاته
- (د) مقدار حرارته النوعية

8 أى من المواد التالية تمتلك أعلى ضغط بخارى عند نفس درجة الحرارة؟


(أ) محلول كلوريد الصوديوم (NaCl)

(ب) محلول كلوريد الكالسيوم (CaCl_2)

(ج) محلول كبريتات الماغنيسيوم (MgSO_4)

(د) الماء النقى

9 أى العلاقات البيانية التالية تمثل العلاقة بين نشاط الإنزيم (X) وطاقة تنشيط التفاعلات الحيوية (Y) ؟



10 كل الكائنات المقابلة تحاط مادتها الوراثية بغشاء نووى ما عدا



11 جسمان A و B لهما نفس الكتلة 100 g، لكن حجم الجسم A يساوى 80 cm³، وحجم الجسم B يساوى 50 cm³،

فإن الجسم الذى له كثافة نسبية أكبر هو

(أ) الجسم A فقط (ب) الجسم B فقط (ج) كلاهما متساويان (د) لا يمكن تحديد ذلك

12 إذا زادت كمية الحرارة التى يكتسبها جسم إلى الضعف فإن حرارته النوعية

(أ) تزيد للضعف (ب) تقل للنصف (ج) تظل ثابتة (د) تقل للربع

ثانيًا: الأسئلة المقالية:

1 قطعة من الألومنيوم كتلتها 500 g ودرجة حرارتها 10 °C، تم تسخينها فاكسبت كمية حرارة مقدارها

8970 J فارتفعت درجة حرارتها إلى 30 °C، احسب الحرارة النوعية للألومنيوم.


الإجابة:

2 قارن بين الخلية النباتية والحيوانية من حيث عدد وحجم الفجوات العصارية.

الإجابة:

الخلية الحيوانية	الخلية النباتية

3 من الشكل المقابل:



(أ) حدد الرقم الدال على الروابط التساهمية، واذكر عددها.

(ب) حدد الرقم الدال على الروابط الهيدروجينية، واذكر عددها.

(ج) كم جزيء ماء في الشكل ؟

الإجابة:

أولاً: اختر الإجابة الصحيحة:


1 زيادة المسطحات الخضراء في المدن الجديدة تؤدي إلى

- (أ) زيادة الرطوبة الجوية
(ب) تقليل التبخر من المسطحات المائية
(ج) انخفاض معدلات تكوّن السحب
(د) زيادة الملوحة في الأنهار

2 لو زادت شدة ضوء الشمس بشكل كبير، فإن أكثر ما يتأثر به من عناصر دورة الماء هو معدل

- (أ) التساقط (ب) التسرب (ج) التبخر (د) الجريان

3 الشكل المقابل يوضح الغشاء الخلوي لإحدى الخلايا الحيوانية ، قد ينتقل الماء في الاتجاه (س) حاملاً معه



(أ) CO_2

(ب) الجلوكوز

(ج) الأكسجين

(د) جميع ما سبق

4 إذا انخفض pH لعينة من الماء من 7 إلى 4 ، فإن ذلك يدل على

- (أ) زيادة تركيز أيونات OH^-
(ب) زيادة تركيز أيونات H^+
(ج) ثبات تركيز الأيونات
(د) فقدان الماء للقطبية

5 كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة 1kg من المادة درجة مئوية واحدة تسمى

- (أ) الحرارة الكامنة (ب) السعة الحرارية (ج) الحرارة النوعية (د) معامل التوصيل


6 درجة الحرارة التي تتوقف عندها حركة الجزيئات تماماً تمثل

- (أ) الصفر المطلق (ب) نقطة الغليان (ج) درجة الانصهار (د) درجة التجمد

7 يوضح الرسم البياني المقابل كتلاً مختلفة لمادة (KCl) مذابة في كميات متساوية من الماء. أي المحاليل التالية له

أقل درجة تجمد ؟

كتلة المذاب (g)




(أ) A (ب) B

(ج) C (د) D

8 يبدأ السائل في الغليان عندما يكون ضغطه البخاري

- (أ) أقل من الضغط الواقع عليه
(ب) أكبر من الضغط الواقع عليه
(ج) مساوياً للضغط الواقع عليه
(د) ضعف الضغط الواقع عليه


9 كل العضيات التالية توجد في الخلية الحيوانية ما عدا



10 ارتباط الركيزة بالإنزيم في موقع نشط محدد يشبه مبدأ

- (أ) الانتشار البسيط
(ب) القفل والمفتاح
(ج) التفاعلات الطاردة للحرارة
(د) الاتزان الديناميكي

11 بفرض أن المادة (A) تغلى عند درجة حرارة 90°C ، فعند تعرضها لضغط عالٍ كما هو موضح بالشكل ، فإن درجة



غليانها تقريباً.....

- (أ) 82°C
(ب) 90°C
(ج) 92°C
(د) 70°C

12 إذا كانت كتلة الجسم 200g وحجمه 250cm^3 ، فإن الكثافة النسبية للجسم إذا كانت كثافة الماء 1g/cm^3 تساوى

- (أ) 0.6
(ب) 0.8
(ج) 1.0
(د) 1.2

ثانيًا: الأسئلة المقالية:

1 ما النتائج المترتبة على فقدان النباتات صبغة الكلوروفيل ؟

الإجابة:

.....

.....

.....

.....

2 ساق من الكربون كتلتها 100g ، تم تسخينها فاكستبت كمية من الحرارة قيمتها 1420J ، احسب معدل التغيير

في درجة حرارة الساق. (علمًا بأن الحرارة النوعية للكربون 710J/kg.k)

الإجابة:

.....

.....

.....

.....

3 علل : تسخن اليابسة أسرع من الماء عند تعرضهما لنفس كمية الحرارة.

الإجابة:

.....

.....

.....


.....



أولاً: اختر الإجابة الصحيحة:

1 الشكل المقابل يوضح فتحات ميكروسكوبية بورقة نبات ما في أوقات مختلفة من اليوم ، ادرسه ثم حدد: أى مما يلي

صحيح؟



(أ) الثغور (1) يساعد على حدوث عملية النتج أثناء الليل

(ب) الثغور (2) يساعد على حدوث عملية التنفس أثناء النهار


(ج) الثغور (1) يساعد على حدوث عملية النتج أثناء النهار

(د) الثغور (1 ، 2) ليس لهما أهمية في عملية النتج

2 تشارك الكائنات الحيوانية في دورة الماء الهيدرولوجية من خلال عملية

(أ) الإخراج والتنفس معاً (ب) النتج (ج) البناء الضوئي (د) كل ما سبق

3 أى مما يلي لا يمثل البيان (س)؟



(أ) يمثل نوعاً من التجاذب الكهروستاتيكي

(ب) يمثل نوعاً من مشاركة إلكترونات التكافؤ

(ج) يمثل نوعاً من الروابط التساهمية

(د) رابطة لا توجد بين جزيئات الماء

4 تصل درجة غليان كبريتيد الهيدروجين إلى 61°C - وذلك بسبب

(أ) وجود روابط هيدروجينية بين جزيئاته


(ج) عدم وجود روابط هيدروجينية بين جزيئاته

(د) لا يوجد إجابة صحيحة

5 النسبة بين عدد الروابط التساهمية والروابط الهيدروجينية لجزء الماء الواحد تساوى

(أ) 2 : 1 (ب) 1 : 2 (ج) 4 : 1 (د) 1 : 1

6 يمكن التعبير عن العلاقة بين وجود الروابط الهيدروجينية والحرارة النوعية من خلال الشكل



7 تقوم البكتيريا بتدعيم جدارها الخلوى بمادة

(أ) البكتين (ب) الكيوتين (ج) الببتيدوجليكان (د) اللجنين

8 كل الكائنات التالية تستطيع تنظيم درجة حرارة أجسامها ما عدا



9 بفحص خلية تحت الميكروسكوب لوحظ وجود مادة الكيتين في جدارها ، مما يؤكد أنها خلية لـ

- (أ) نجم البحر (ب) طحلب ذهبي (ج) **فطر الخميرة** (د) جلد إنسان

10 أى الكائنات التالية تشترك في وجود غشاء نووى حول مادتها الوراثية ؟

(أ) **الطحالب الذهبية وفطر الخميرة**

(ب) فطر الخميرة وبكتيريا النوستوك

(ج) الثدييات وبدائيات النواة

(د) البكتيريا والفطريات

11 عند مقارنة قطعة من الألومنيوم كتلتها 270 g وحجمها 100 cm^3 ، وأخرى من الخشب كتلتها 80 g وحجمها

100 cm^3 ، أى المادتين لها كثافة نسبية أكبر؟

(أ) **الألومنيوم** (ب) الخشب (ج) كلاهما متساويان (د) لا يمكن التحديد

12 إذا كانت الحرارة النوعية للمادة (أ) أعلى من الحرارة النوعية للمادة (ب) ، فماذا يمكن أن نستنتج من سلوك هاتين

المادتين عند رفع درجة حرارتهما ؟

(أ) **المادة (أ) ستسخن أبطأ من المادة (ب)** (ب) ستسخن المادتان بنفس السرعة

(ج) هذا العامل لن يؤثر في سرعة التسخين (د) المادة (أ) ستسخن أسرع من المادة (ب)

ثانيًا: المقالى

1 قطعة من الحديد كتلتها 300 g وكانت درجة حرارتها 27°C ، اكتسبت كمية من الحرارة قيمتها 5000 J، فما هى

درجة حرارتها النهائية ؟ (علمًا بأن : الحرارة النوعية للحديد = 450 J/kg.K)

الإجابة:

$$(T_i - T_f) \times c \times m = \Delta T \times c \times m = Q$$

نعوض القيم:

$$(27 - T_f) \times 450 \times 0.3 = 5000$$

نحسب الناتج داخل القوس أولاً:

$$135 = 450 \times 0.3$$

إذاً:

$$(27 - T_f) \times 135 = 5000$$

نقسم الطرفين على 135:

$$27 - T_f = 5000/135$$

$$27 - T_f = 37.04$$

نضيف 27 للطرفين:

$$C^\circ 64.04 = 27 + 37.04 = T_{\text{النهائية}}$$

2 ما النتائج المترتبة على ارتفاع درجة حرارة الجسم بالنسبة لنشاط الإنزيمات ؟

الإجابة:

- يقل نشاط الإنزيم تدريجياً إلى أن يتوقف نشاطه.

3 لماذا يلجأ الضفدع للاختباء داخل الماء أثناء فترة البيات الشتوى ؟

الإجابة:

- لأنه من ذوات الدم البارد؛ أى تعتمد درجة حرارته على درجة حرارة الوسط المحيط به ، وبسبب ارتفاع الحرارة النوعية للماء يحتفظ بدرجة حرارة تناسب جسمه من أجل البقاء في فصل الشتاء .



أولاً: اختر الإجابة الصحيحة:

1 كل مما يلي يصلح لرى التربة الزراعية ما عدا

- (أ) المياه الجوفية (ب) الجداول (ج) المحيطات (د) الأنهار


2 الرسم المقابل يوضح عملية النتح في أحد النباتات ، أى البيانات التالية يعبر عن الماء في حالته البخارية ؟

A (أ)

B (ب)

C (ج)

(د) لا توجد إجابة صحيحة



3 أى نوع من الأملاح ينتج محلولاً متعادلاً عند ذوبانه في الماء ؟

(أ) كلوريد الأمونيوم

(ب) بيكربونات الصوديوم

(ج) كلوريد الصوديوم

(د) بيكربونات الأمونيوم

4 الخاصية الكيميائية التى تساعد على انتقال الفضلات من الخلايا تشير إلى أن الماء

(أ) مذيب قطبي عام

(ب) كثافته منخفضة

(ج) حرارته النوعية مرتفعة

(د) درجة تجمده مرتفعة

5 فى الشكل المقابل ، يوجد عدة أواني طهى على ارتفاعات مختلفة تحتوى على كمية متساوية من الماء ، أى الخيارات التالية


”من اليمين لليسار“ يرتب درجة غليان الأواني الثلاثة تنازلياً ؟

X ، Y ، Z (أ)

Y ، X ، Z (ب)

Z ، Y ، X (ج)

X ، Z ، Y (د)



6 مادتان مختلفتان (Y, X) لهما كتلتان متساويتان ، تم إكسابهما نفس كمية الحرارة فارتفعت درجة حرارة X بمقدار

10 °C وارتفعت درجة حرارة Y بمقدار 5 °C ، فهذا يعنى أن

(أ) الحرارة النوعية لمادة X = $\frac{1}{5}$ الحرارة النوعية لمادة Y

(ب) الحرارة النوعية لمادة X = ضعف الحرارة النوعية لمادة Y

(ج) الحرارة النوعية لمادة X = نصف الحرارة النوعية لمادة Y

(د) الحرارة النوعية لمادة X = الحرارة النوعية لمادة Y

7 إذا زادت كمية الحرارة التى يكتسبها جسم إلى الضعف فإن حرارته النوعية

(أ) تزيد للضعف (ب) تقل للنصف (ج) تظل ثابتة (د) تقل للربع

8 أى المواد التالية تمتلك حرارة نوعية أعلى؟

(أ) الجليد (ب) الماء السائل (ج) الحديد (د) الرصاص

9 أى من التالى يعبر عن البيان (س) ؟

(أ) تحاط مادتها الوراثية بغشاء نووى

(ب) كائنات عديدة الخلايا

(ج) كائنات ذاتية التغذية

(د) كائنات غير ذاتية التغذية

10 كل الكائنات التالية تمتلك خلاياها جدارًا خلويًا ما عدا

(أ) نبات الفول (ب) البكتيريا

(ج) فطر الخميرة (د) الحشرات

11 إذا كانت الكثافة النسبية لمادة تساوى 1.6 وحجم مكعب من هذه المادة 250 cm³ ، فإن كتلة المكعب تساوى

(أ) 200 g (ب) 250 g (ج) 300 g (د) 400 g

12 أى من درجات الحرارة التالية يكون متوسط طاقة حركة جزيئات المادة فيها أكبر ما يمكن ؟


(أ) 0 °C (ب) 273 °C (ج) -273 °C (د) 100 °C

ثانياً: الأسئلة المقالية:

1 علل : الإنزيمات ضرورية للعمليات الحيوية .

الإجابة:

- لأنها تغير من سرعة التفاعلات الحيوية دون أن تُستهلك ، كما أنها تقلل من طاقة التنشيط اللازمة لبدء التفاعلات الحيوية .



2 من الشكل المقابل أجب عن التالي:

أ ما اسم العملية الموضحة بالشكل؟

ب ما هي أهميتها للنبات؟

الإجابة: (أ) عملية النتح (ب) تولد قوة شد للماء من أسفل لأعلى عبر أوعية الخشب

3 قطعة من الحديد كتلتها 0.5 kg ودرجة حرارتها 10 °C ، ما هي درجة الحرارة التي تصل إليها عندما تكتسب كمية

من الحرارة مقدارها 1155 J ؟ (علماً بأن الحرارة النوعية للحديد 450 J/kg.K)

الإجابة:

خطوات الحل:

1. حساب التغير في درجة الحرارة (ΔT):

نعيد ترتيب القانون لحساب ΔT :

$$\Delta T = Q / (c \times m)$$

$$\Delta T = 1155 \text{ J} / (0.5 \text{ kg} \times 450 \text{ J/kg}\cdot\text{K})$$

$$\Delta T = 1155 / 225$$

$$\Delta T = 5.133 \text{ K}$$

(أو °C لأن التغير متساوٍ في الوحدتين)

2. حساب درجة الحرارة النهائية (T_2):

$$\Delta T = T_2 - T_1 \text{ بما أن}$$

$$T_2 = T_1 + \Delta T$$

$$T_2 = 10 \text{ °C} + 5.133 \text{ °C}$$

$$T_2 = 15.133 \text{ °C}$$

أولاً: اختر الإجابة الصحيحة:

1 توقف عملية النتح في النباتات سيؤثر بشكل مباشر على

(أ) انخفاض ملوحة المحيطات

(ب) تناقص بخار الماء في الجو

(ج) زيادة معدلات الأمطار

(د) ثبات دورة الكربون

2 أى العمليات التالية تسهم في نقل الماء من الغلاف المائى إلى الغلاف الصخرى؟

(أ) الترسيب

(ب) التسرب

(ج) التبخر

(د) النتح


3 نوع المحلول الناتج عن ذوبان المركب في الشكل المقابل

(أ) متعادل

(ب) متردد

(ج) حامضى

(د) قاعدى



4 عند إضافة كلوريد الصوديوم في الماء ، تحاط أيونات الكلوريد السالبة بـ.....

(أ) الشحنات السالبة الجزئية للهيدروجين

(ب) الشحنات السالبة الجزئية للأكسجين

(ج) الشحنات الموجبة الجزئية للأكسجين

(د) الشحنات الموجبة الجزئية للهيدروجين

5 أى العوامل التالية تسبب تكوين التيارات البحرية العمودية؟

(أ) الكثافة والملوحة فقط

(ب) الضغط والحرارة فقط

(ج) الكثافة ودرجة الحرارة والملوحة

(د) الملوحة والضغط دون حرارة


6 من الشكل المقابل، ما الذى يعبر عنه التركيب (س) ؟

(أ) غشاء الخلية

(ب) جدار خلوى

(ج) بلاستيذة خضراء

(د) كل ما سبق



7 كمية معينة من مادة ارتفعت درجة حرارتها من 30°C إلى 310K ، فإن التغير في درجة الحرارة يساوي.....

- (أ) 7K (ب) 37°C (ج) 280K (د) 280°C


8 بقاء درجة حرارة الماء ثابتة رغم اكتسابه حرارة أثناء الغليان يعكس خاصية

- (أ) الحرارة النوعية (ب) الحرارة الكامنة للانصهار
(ج) الحرارة الكامنة للتصعيد (د) السعة الحرارية الكلية

9 عند صعود الهواء الدافئ إلى أعلى يبرد ويتمدد، مما يؤدي إلى حدوث

- (أ) التكاثف (ب) الاتزان الحراري (ج) التوصيل (د) الحمل الحراري

10 أي العضيات التالية مسئولة عن التخزين في الخلية ؟



11 جسم كثافته النسبية 0.7، تم وضعه في الماء. السلوك المتوقع للجسم هو

- (أ) لا يطفو فوق سطح الماء (ب) يغوص إلى القاع
(ج) يبقى معلقاً في منتصف عمود الماء (د) يطفو جزئياً ويغمر جزء صغير منه

12 درجة غليان الماء النقي H_2O أعلى من درجة غليان كبريتيد الهيدروجين H_2S بمقدار

- (أ) 100°C (ب) -61°C (ج) 39°C (د) 161°C

ثانياً: الأسئلة المقالية:

1 قارن بين كمية الحرارة ودرجة الحرارة من حيث (المفهوم ، وحدة القياس)

كمية الحرارة	درجة الحرارة
الطاقة المنتقلة من جسم أو إليه أو خلاله عند وجود فرق في درجات الحرارة. تقاس بوحدة (J).	متوسط طاقة الحركة لجزيئات أي جسم أو نظام. تقاس بوحدة (K) أو $(^{\circ}\text{C})$.

2 علل : وجود الماء ضرورى لاستمرار الحياة فى الكائنات الحية.

الإجابة:

- لأنه يمتلك خواص فريدة تعتمد عليها العمليات الحيوية فى جميع خلايا الكائنات الحية.

3 ما هى كتلة قطعة من الحديد يلزم لرفع درجة حرارتها من 15°C إلى 25°C ، عند اكتساب كمية من الحرارة تقدر

بـ 1800 J والحرارة النوعية للحديد تساوى $450\text{ J/kg}\cdot\text{K}$ ؟

الإجابة:

خطوات الحل:

1. حساب التغير فى درجة الحرارة (ΔT):

$$\begin{aligned}\Delta T &= T_2 - T_1 \\ \Delta T &= 25^{\circ}\text{C} - 15^{\circ}\text{C} \\ \Delta T &= 10^{\circ}\text{C}\end{aligned}$$

2. إعادة ترتيب القانون لحساب الكتلة (m):

$$m = Q / (c \times \Delta T)$$

3. التعويض بالقيم وحساب الكتلة:

$$\begin{aligned}m &= 1800\text{ J} / (450\text{ J/kg}\cdot^{\circ}\text{C} \times 10^{\circ}\text{C}) \\ m &= 1800\text{ J} / (4500\text{ J/kg}) \\ m &= 0.4\text{ kg}\end{aligned}$$

أولاً: اختر الإجابة الصحيحة:

1 تعتبر الأنهار الجليدية جزءاً من دورة الماء؛ لأنها

- (أ) تعمل كخزان مؤقت للماء العذب
(ب) تزيد من ملوحة البحار
(ج) تنقل الأملاح إلى اليابس
(د) تقلل من التبخر

2 زيادة التبخر من سطح المحيطات دون تعويض بالتساقط تؤدي إلى تغير ملحوظ في

- (أ) شدة الضوء (ب) ملوحة المياه (ج) الضغط المائي (د) الحرارة النوعية

3 عند إذابة بيكربونات الأمونيوم في الماء فمن المتوقع أن درجة pH تساوى تقريباً


- (أ) 2 (ب) 4.8 (ج) 12 (د) 7

4 عند مقارنة الماء مع كبريتيد الهيدروجين، فإن الفرق في درجة الغليان يرجع أساساً إلى

- (أ) الكتلة الجزيئية (ب) الروابط الهيدروجينية
(ج) الحرارة النوعية (د) الكثافة النسبية

5 أى العبارات التالية صحيحة عن الشكل المقابل؟

- (أ) الهواء س أكبر في الكثافة من الهواء ص
(ب) الهواء ص أكبر في الكثافة من الهواء س
(ج) الهواء س و ص متساويان في الكثافة
(د) الهواء ص أقل في الكثافة من الهواء س



6 جسمان أ، ب من نفس المادة وكتلتهما X_1 ، X_2 على الترتيب، واكتسب الجسمان كمية من الحرارة مقدارها Z

وارتفعت الحرارة بمقدار 20°C ، 25°C على الترتيب، فإن النسبة بين كتلتى الجسمين $\frac{X_1}{X_2}$ تساوى

- (أ) $\frac{1}{2}$ (ب) $\frac{5}{4}$ (ج) $\frac{2}{1}$ (د) $\frac{4}{3}$

7 عند قياس درجة حرارة جسم باستخدام الترمومتر، فإن القراءة تعكس

- (أ) الطاقة الداخلية الكلية للجسم (ب) معدل انتقال الطاقة الحرارية منه
(ج) متوسط طاقة حركة جزيئاته (د) مقدار حرارته النوعية

8 أى من المواد التالية تمتلك أعلى ضغط بخارى عند نفس درجة الحرارة؟


(أ) محلول كلوريد الصوديوم (NaCl)

(ب) محلول كلوريد الكالسيوم (CaCl_2)


(ج) محلول كبريتات الماغنيسيوم (MgSO_4)

(د) الماء النقى


9 أى العلاقات البيانية التالية تمثل العلاقة بين نشاط الإنزيم (X) وطاقة تنشيط التفاعلات الحيوية (Y) ؟




(د)



(ج)



(ب)



(أ)

10 كل الكائنات المقابلة تحاط مادتها الوراثية بغشاء نووى ما عدا




د



ج



ب



أ

11 جسمان A و B لهما نفس الكتلة 100 g، لكن حجم الجسم A يساوى 80 cm³، وحجم الجسم B يساوى 50 cm³،

فإن الجسم الذى له كثافة نسبية أكبر هو

(أ) الجسم A فقط (ب) الجسم B فقط (ج) كلاهما متساويان (د) لا يمكن تحديد ذلك

12 إذا زادت كمية الحرارة التى يكتسبها جسم إلى الضعف فإن حرارته النوعية

(أ) تزيد للضعف (ب) تقل للنصف (ج) تظل ثابتة (د) تقل للربع

ثانيًا: الأسئلة المقالية:

1 قطعة من الألومنيوم كتلتها 500 g ودرجة حرارتها 10 °C، تم تسخينها فاكسبت كمية حرارة مقدارها

8970 J فارتفعت درجة حرارتها إلى 30 °C، احسب الحرارة النوعية للألومنيوم.

الإجابة:

$$\frac{8970}{20.0.5} = \frac{Q}{m \cdot \Delta T} = c$$


$$897 \text{ }^{\circ}\text{C J/kg} = \frac{8970}{20.0.5} = c$$

2 قارن بين الخلية النباتية والحيوانية من حيث عدد وحجم الفجوات العصارية.

الإجابة:

الخلية الحيوانية	الخلية النباتية
أعدادها كثيرة. صغيرة الحجم.	تكون واحدة في وسط الخلية تقريبًا. كبيرة الحجم.

3 من الشكل المقابل:



(أ) حدد الرقم الدال على الروابط التساهمية، واذكر عددها.

(ب) حدد الرقم الدال على الروابط الهيدروجينية، واذكر عددها.

(ج) كم جزيء ماء في الشكل ؟

الإجابة:

(أ) (1) ، يوجد 6 روابط تساهمية بالشكل

(ب) (2) ، يوجد رابطتان هيدروجينيتان بالشكل

(ج) 3 جزيئات

1 زيادة المسطحات الخضراء في المدن الجديدة تؤدي إلى

(أ) زيادة الرطوبة الجوية (ب) تقليل التبخر من المسطحات المائية

(ج) انخفاض معدلات تكوّن السحب (د) زيادة الملوحة في الأنهار

2 لو زادت شدة ضوء الشمس بشكل كبير، فإن أكثر ما يتأثر به من عناصر دورة الماء هو معدل

(أ) التساقط (ب) التسرب (ج) التبخر (د) الجريان


3 الشكل المقابل يوضح الغشاء الخلوي لإحدى الخلايا الحيوانية، قد ينتقل الماء في الاتجاه (س) حاملاً معه

(أ) CO_2

(ب) الجلوكوز

(ج) الأكسجين

(د) جميع ما سبق



4 إذا انخفض pH لعينة من الماء من 7 إلى 4، فإن ذلك يدل على

(أ) زيادة تركيز أيونات OH^- (ب) زيادة تركيز أيونات H^+

(ج) ثبات تركيز الأيونات (د) فقدان الماء للقطبية

5 كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة 1kg من المادة درجة مئوية واحدة تسمى

(أ) الحرارة الكامنة (ب) السعة الحرارية (ج) الحرارة النوعية (د) معامل التوصيل


6 درجة الحرارة التي تتوقف عندها حركة الجزيئات تماماً تمثل

(أ) الصفر المطلق (ب) نقطة الغليان (ج) درجة الانصهار (د) درجة التجمد

7 يوضح الرسم البياني المقابل كتلاً مختلفة لمادة (KCl) مذابة في كميات متساوية من الماء. أي المحاليل التالية له

أقل درجة تجمد ؟

كتلة المذاب (g)



(أ) A (ب) B

(ج) C (د) D

8 يبدأ السائل في الغليان عندما يكون ضغطه البخاري


(أ) أقل من الضغط الواقع عليه

(ب) أكبر من الضغط الواقع عليه

(ج) مساوياً للضغط الواقع عليه

(د) ضعف الضغط الواقع عليه


9 كل العضيات التالية توجد في الخلية الحيوانية ما عدا



10 ارتباط الركيزة بالإنزيم في موقع نشط محدد يشبه مبدأ

- (أ) الانتشار البسيط
(ب) القفل والمفتاح
(ج) التفاعلات الطاردة للحرارة
(د) الاتزان الديناميكي

11 بفرض أن المادة (A) تغلى عند درجة حرارة 90°C ، فعند تعرضها لضغط عالٍ كما هو موضح بالشكل، فإن درجة غليانها تقريباً



- (أ) 82°C
(ب) 90°C
(ج) 92°C
(د) 70°C

12 إذا كانت كتلة الجسم 200g وحجمه 250cm^3 ، فإن الكثافة النسبية للجسم إذا كانت كثافة الماء 1g/cm^3 تساوى

- (أ) 0.6
(ب) 0.8
(ج) 1.0
(د) 1.2

ثانيًا: الأسئلة المقالية:

1 ما النتائج المترتبة على فقدان النباتات صبغة الكلوروفيل ؟

الإجابة:

- تتوقف عملية البناء الضوئي، فيقل إنتاج الغذاء والطاقة.

2 ساق من الكربون كتلتها 100g ، تم تسخينها فاكستبت كمية من الحرارة قيمتها 1420J ، احسب معدل التغير

في درجة حرارة الساق. (علمًا بأن الحرارة النوعية للكربون 710J/kg.k)

الإجابة:

$$\frac{Q}{m \cdot c} = \Delta T$$
$$20^\circ\text{C} \approx \frac{1420}{71} = \frac{1420}{710 \cdot 0.1} = \Delta T$$

3 علل : تسخن اليابسة أسرع من الماء عند تعرضهما لنفس كمية الحرارة.

الإجابة:

- لأن الحرارة النوعية للماء أكبر من الحرارة النوعية للرمال والصخور المكونة لليابسة.


حمل الآن

مجاناً وحصرياً

المراجعة رقم (3)

اختبار شهر اكتوبر





Sheet

علوم - متكاملة - نرم - أول

الدرس الأول / الغلاف المائي على كوكب الأرض

- ١) أي العمليات التالية لو توقفت ستؤدي إلى اضطراب توازن دورة الماء في الطبيعة على سطح الأرض ، وفي الغلاف الجوي بشكل مباشر ؟
(أسئلة امتحانات العاقلات)
- أ) الجريان . ب) التبخر . ج) التسرب في التربة . د) النتج .
- ٢) أي العمليات التالية في دورة الماء في الطبيعة تعتمد على تأثير الجاذبية ؟
(كتاب الاضراء)
- أ) التبخر . ب) التكثف . ج) النتج . د) التسرب .
- ٣) أي العمليات التالية في دورة الماء في الطبيعة لا تحدث بتأثير الجاذبية الأرضية ؟
(كتاب الاضراء)
- أ) هطول الأمطار . ب) تسرب المياه الجوفية . ج) التبخر من البحار . د) جريان المياه السطحية .
- ٤) كل مما يأتي من الكائنات الحية للبيئة ، باستثناء
(كتاب الاضراء)
- أ) البكتريا . ب) نبات القمح . ج) الحمار البري . د) نهر النيل .
- ٥) أي مما يلي يمثل أعلى مصدر للماء على سطح الأرض ؟
(كتاب الامتحانات)
- أ) الصيحات . ب) البحيرات العذبة . ج) المياه الجوفية . د) الأنهار الجليدية .
- ٦) ما الدور المباشر لعملية النتج في الدورة الهيدرولوجية ؟
(أسئلة امتحانات العاقلات)
- أ) تسرب الماء خلال الضفوف الرسوبية . ب) تكثف بخار الماء مكوناً السحب . ج) زيادة نسبة CO₂ في الغلاف الجوي . د) زيادة نسبة بخار الماء في الغلاف الجوي .
- ٧) أي العبارات الآتية لا تنطبق على دورة الماء في الطبيعة ؟
(كتاب الامتحانات)
- أ) تشمل حركة الماء خلال العديد من المرات . ب) الكائنات الحية لها دور في استمراريتها . ج) تحافظ على ثبات سطح الأرض . د) تشكل نظام مغلق تقريباً .
- ٨) ما العملية التي تحدث لنتائج عملية النتج خلال الدورة الهيدرولوجية ؟
(أسئلة امتحانات العاقلات)
- أ) البكتريا . ب) نبات القمح . ج) الحمار البري . د) نهر النيل .
- ٩) أي العوامل الآتية لا يؤثر على عملية النتج ؟
(كتاب الامتحانات)
- أ) عدد أوراق النبات . ب) عدد الأزهار والثمار . ج) رطوبة التربة . د) درجة حرارة الجو .
- ١٠) زيادة معدل النتج في النبات تؤثر بشكل غير مباشر على دورة الماء في الطبيعة من خلال :
(كتاب الاضراء)
- أ) تقليل هطول الأمطار . ب) زيادة بخار الماء في الغلاف الجوي . ج) خفض معدل التبخر من السطحات المائية . د) تثبيت ثاني أكسيد الكربون في الأوراق .





Sheet

علوم - متكاملة - نرم - أول

(أسئلة امتحانات العانظات)

١١) الترتيب الصحيح لعمليات تحويل مياه البحر المالحة الى مياه عذبة هو

- أ) تكتيف - تبخر - نزول الأمطار - تسرب المياه خلال الضففر الرسوبية .
- ب) تبخر - تكتيف - تسرب المياه خلال الضففر الرسوبية - نزول الأمطار .
- ج) تبخر - تكتيف - نزول الأمطار - تسرب المياه خلال الضففر الرسوبية .
- د) تسرب المياه خلال الضففر الرسوبية - نزول الأمطار - تبخر - تكتيف .

(أسئلة امتحانات العانظات)

١٢) أى العمليات التالية تمثل الجزء الكيمائى فى دورة المياه فى الطبيعة ؟

- أ) التبخر .
- ب) التكتيف .
- ج) النتج .
- د) تكون الأمطار الحامضية .

(كتاب الأرضاء)


١٣) تشمل الدورة الهيدرولوجية بعض العمليات البيولوجية مثل

- أ) تجمد الماء .
- ب) تسرب الماء فى مسام التربة .
- ج) النتج من أوراق النباتات .
- د) تبخر الماء من المحيطات .

(أسئلة امتحانات العانظات)

١٤) الخطط القابل : يوضع مساراً مغلقة لبعض العمليات (X - Y - Z) التى تمثل دورة الماء الهيدرولوجية ،

ادرسه جيداً : ثم حدد أى العبارات التالية صحيحة ؟



- أ) العملية (X) تسرب وتسهم فى تكوين السحب .
- ب) العملية (Y) تكتيف وتسهم فى تكوين السحب .
- ج) العملية (Z) سقوط أمطار وتعمل على إزابة الضففر .
- د) العملية (X) تكتيف وتسهم فى تكوين السحب .

(أسئلة امتحانات العانظات)

١٥) أى العمليات التالية قد تكون مصدر مباشر للمياه الجوفية ؟

- أ) تبخر الماء .
- ب) التنفس فى الإنسان .
- ج) النتج فى النبات .
- د) تسرب المياه .

(كتاب الامتحنات)

١٦) ما العملية الحيوية التى تقوم بها الحيوانات وتساهم من خلالها فى دورة الماء فى الطبيعة ؟

- أ) التنفس .
- ب) النتج .
- ج) التمثيل الضوئى .
- د) النمو .

(كتاب الامتحنات)

١٧) أى مما يلى لا يمثل دوراً لعملية النتج فى النبات ؟

- أ) التخلص من الماء الزائد .
- ب) التخلص من الأملاح الزائدة .
- ج) سحب الماء والأملاح من الجذر الى الأجزاء العليا .
- د) خفض درجة حرارة النبات .

(كتاب الأرضاء)

١٨) كل مما يلى من المواد التى يتخلص منها الكائن الحي عن طريق عملية الإفراج ، ما عدا :

- أ) غاز CO₂ .
- ب) اليوريا .
- ج) كلوريد الأمونيوم .
- د) بخار الماء .

(أسئلة الوزارة)

١٩) أى مما يلى لا يعد من النفايات النيتروجينية ؟

- أ) النشادر .
- ب) غاز النيتروجين .
- ج) البولينا .
- د) محض البوليك .



01026675233

2

إعداد : أ / أحمد شاهين





Sheet

علوم - متكاملة - ترم - أول

٢٠) هي طبقة خارجية صلبة وصفية من الأرض ،

تتكون من القشرة الأرضية والطبقة الخارجية الصلبة من الرياح العلوي .

(أسئلة الوزارة)

أ) الغلاف الصخري . ب) الغلاف الجوي . ج) الغلاف المحيطي . د) الغلاف المائي .

(أسئلة الوزارة)

٢١) جميع ما يلي من المكونات غير الحية في البيئة ، باستثناء

أ) الهواء . ب) الماء . ج) التربة . د) الإنسان .

(أسئلة الوزارة)

٢٢) النسبة بين الغلاف الصخري والغلاف المائي اللذين يغطيان سطح الأرض تساوي

أ) $\frac{3}{7}$. ب) $\frac{7}{3}$. ج) $\frac{3}{10}$. د) $\frac{7}{10}$.

(أسئلة الوزارة)


٢٣) من أهمية النتح للنباتات

- أ) زيادة درجة حرارة النباتات .
- ب) زيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون .
- ج) المساعدة في رفع الأملاح والماء إلى الأجزاء العليا .
- د) تقليل قدرة النبات على رفع الأملاح والماء إلى الأجزاء العليا .

(أسئلة الوزارة)

٢٤) يوضح الشكل المقابل : جزءاً من دورة الماء :

تساهم العملية المشار إليها بالرقم (١) في



أ) هطول الأمطار .

ب) تشكيل المياه الجوفية .

ج) تشكيل السحب .

د) تساقط الثلج .

(أسئلة الوزارة)

٢٥) ما العمليات البيولوجية التي تساهم في دورة الماء ؟

(أسئلة الوزارة)

٢٦) ما العمليات الرئيسية في دورة الماء ؟


(أسئلة الوزارة)

٢٧) ما القصور بعملية الأضراج ؟

(أسئلة الوزارة)

٢٨) ماذا سيحدث إذا لم تتمكن النباتات من إجراء عملية النتح ؟





Sheet

علوم - متكاملة - نرم - أول

الدرس الثاني / الخواص الكيميائية للماء

(كتاب الاضواء)

١) جميع ما يلي من خصائص الماء التي تساعد على دعم الحياة ، ما عدا أنه

- أ) يساعد في نقل المواد الغذائية داخل الخلايا .
- ب) يذيب الكثير من المواد الكيميائية .
- ج) يتغير باستمرار في ثلاث حالات صلبة وسائلة وغازية .
- د) يختلط ببعض الأحماض في الطر الحامض .

(كتاب الامتحانات)

٢) أي مما يلي ليس من خصائص الماء التي تدعم الحياة ؟

- أ) إذابة العديد من المركبات الكيميائية .
- ب) إمرار المواد اللازمة لداخل الخلية .
- ج) إمرار الفضلات خارج الخلية .
- د) اختلاف كتلة عنصريه .

(كتاب الاضواء)

٣) يترتب على ارتباط جزيئات الماء بروابط هيدروجينية .

- أ) ارتفاع الحرارة النوعية للماء .
- ب) قطبية جزيء الماء .
- ج) اختلاف كتلة الأكسجين والهيدروجين .
- د) وجود الماء في ثلاث حالات .

(كتاب الامتحانات)

٤) تجميع قطبية جزيء الماء الى اختلاف

- أ) الكتلة الذرية لعنصريه .
- ب) فرق السالبية الكهربائية لعنصريه .
- ج) عدد الروابط التساهمية بين ذراته .
- د) نوع الروابط التساهمية بين ذراته .

(أسئلة امتحانات العاقلات)

٥) تسبب قطبية جزيء الماء في

- أ) ذوبان كثير من المواد فيه .
- ب) انخفاض كثافته .
- ج) تأثيره الحامضي .
- د) تأثيره القاعدي .

(كتاب الاضواء)

٦) تجميع قطبية جزيء الماء الى أن

- أ) ذرة الأكسجين في جزيء الماء تتحول الى أيون موجب وذرة الهيدروجين تتحول الى أيون سالب .
- ب) السالبية الكهربائية للهيدروجين أكبر من السالبية الكهربائية للأكسجين .
- ج) ذرة الأكسجين في جزيء الماء تحمل شحنة موجبة جزئية ، وذرة الهيدروجين تحمل شحنة سالبة جزئية .
- د) ذرة الهيدروجين في جزيء الماء تحمل شحنة موجبة جزئية ، وذرة الأكسجين تحمل شحنة سالبة جزئية .

٧) النسبة بين عدد الروابط الهيدروجينية التي يستطيع جزيء ماء واحد تكوينها الى عدد الروابط التساهمية في جزيء الماء الواحد تساوي

(أسئلة امتحانات العاقلات)

أ) $\frac{4}{1}$

ب) $\frac{2}{1}$

ج) $\frac{1}{2}$

د) $\frac{1}{1}$



01026675233

4

إعداد : أ / أحمد شاهين





Sheet

علوم - متكاملة - نرم - أول

٨) النسبة بين عدد الشحنات الموجبة الى عدد الشحنات السالبة على جزيء الماء ،

(أسئلة امتحانات العانظات)

تساوى

١) $\frac{4}{1}$

٢) $\frac{2}{1}$


٣) $\frac{1}{2}$

٤) $\frac{1}{1}$


٩) أي الأشكال التفضيلية التالية يعبر بشكل صحيح عن تركيب جزيء الماء ،

(أسئلة امتحانات العانظات)


والزاوية بين الرابطتين التساهميتين فيه ؟



د



ج



ب



أ

١٠) عدد الإلكترونات ذرة الأكسجين التي تشارك في تكوين الرابط التساهمية في جزيء الماء

(كتاب الامتحنات)

١) 4

٢) 3

٣) 2

٤) 1

١١) عدد الإلكترونات التي تشارك بها ذرتا الهيدروجين في تكوين الرابط التساهمية في جزيء الماء :

(كتاب الامتحنات)

١) 4

٢) 3

٣) 2

٤) 1

١٢) ما نوع الرابطة الكيميائية بين ذرتي الهيدروجين والأكسجين في جزيء الماء وبين جزيئات الماء ؟

(أسئلة الوزارة)

أ) أيونية - تساهمية .

ب) هيدروجينية - تساهمية أحادية .

ج) تساهمية ثنائية - هيدروجينية .

د) تساهمية أحادية - هيدروجينية .

١٣) أي مما يلي عند ذوبانه في الماء القطر يزيد من قيمة pH ؟

(أسئلة امتحانات العانظات)

أ) ملح كلوريد الصوديوم .

ب) ملح بيكربونات الصوديوم .

ج) ملح كلوريد الأمونيوم .

د) ملح بيكربونات الأمونيوم .

١٤) عند اضافة القليل من كلوريد الصوديوم الى الماء يحدث كل مما يلي ، ما عدا

(كتاب الاضواء)

أ) التصلب اللاني .

ب) تتفكك أيونات كلوريد الصوديوم .

ج) تتكون روابط هيدروجينية جديدة .

د) تحاط أيونات الصوديوم والكلور بجزيئات الماء .

١٥) أي مما يلي صحيح عن جزيء الماء ؟

(كتاب الامتحنات)

أ) تمثل النسبة المئوية لكتلة الهيدروجين 33.33 %

ب) نسبة كتلة الهيدروجين الى كتلة الأكسجين 2 : 1

ج) تمثل الزاوية الخارجية بين ذرتي الهيدروجين 104.5°

د) تمثل النسبة المئوية لكتلة الأكسجين 88.89 %



01026675233

5

إعداد : أ / أحمد شاهين





(أسئلة الوزارة)

Sheet

علوم - متكاملة - نرم - أول

١٦ ما النسبة التقريبية بين كتلة الأكسجين إلى كتلة الهيدروجين في جزيء الماء ؟

- (أ) $\frac{1}{8}$ (ب) $\frac{1}{2}$ (ج) $\frac{2}{1}$ (د) $\frac{8}{1}$

١٧ أي مما يلي يعبر عن النسب المئوية الكتلية لكل من الهيدروجين والأكسجين على الترتيب في عينة من الماء ؟

- (أ) 33.33 % و 66.67 % (ب) 66.67 % و 33.33 %
 (ج) 11.11 % و 88.89 % (د) 88.89 % و 11.11 %

(أسئلة امتحانات العاقلات)

١٨ ما كتلة الهيدروجين في عينة من الماء القطر كتلتها 200 g ؟

- (أ) 11.11 g (ب) 22.22 g (ج) 88.89 g (د) 177.78 g

١٩ إذا علمت أن كتلة الأكسجين في عينة من الماء تساوي 48 g

(أسئلة امتحانات العاقلات)

فإن كتلة الهيدروجين الموجود في نفس هذه العينة تساوي

- (أ) 32 g (ب) 8 g (ج) 2 g (د) 6 g

٢٠ إذا كانت لدينا عينة من الماء النقي كتلتها 63 g

(أسئلة امتحانات العاقلات)

فإن كتلة الأكسجين في نفس العينة تساوي

- (أ) 7 g (ب) 27 g (ج) 45 g (د) 56 g

٢١ عند مقارنة درجة غليان الماء بدرجة غليان مركب يتشابه معه في التركيب مثل كبريتيد الهيدروجين ،

(أسئلة الوزارة)

نلاحظ :

- (أ) ارتفاع درجة غليان الماء ، بسبب وجود الروابط الهيدروجينية بين جزيئاته .
 (ب) انخفاض درجة غليان الماء ، بسبب وجود الروابط الهيدروجينية بين جزيئاته .
 (ج) ارتفاع درجة غليان كبريتيد الهيدروجين ، بسبب وجود الروابط الهيدروجينية بين جزيئاته .
 (د) انخفاض درجة غليان كبريتيد الهيدروجين ، بسبب وجود الروابط الهيدروجينية بين جزيئاته .

(أسئلة الوزارة)

٢٢ لك مما يلي من النتائج المترتبة على قطبية جزيء الماء ، ما عدا :

- (أ) ارتباط جزيئات الماء معاً بروابط هيدروجينية . (ب) القدرة على إذابة الكثير من الأملاح المعدنية .
 (ج) ارتفاع درجة غليان الماء إلى 100°C (د) القدرة على إذابة مركب عضوي غير قطبي .

(كتاب الضراء)

٢٣ يستطيع كل جزيء ماء تكوين

- (أ) رابطة هيدروجينية واحدة . (ب) اثنان من الروابط الهيدروجينية .
 (ج) ثلاث من الروابط الهيدروجينية . (د) أربع من الروابط الهيدروجينية .

(كتاب الامتعات)

٢٤ أي مما يلي صحيح عن العنصرين اللذين لجزيء الماء ؟

- (أ) الأكسجين أقل كتلة وأكبر سالبة كهربية . (ب) الأكسجين أكبر كتلة وأقل سالبة كهربية .
 (ج) الهيدروجين أكبر كتلة وأكبر سالبة كهربية . (د) الهيدروجين أقل كتلة وأقل سالبة كهربية .



01026675233

6

إعداد : أ / أحمد شاهين





Sheet

(كتاب الامتحانات)

٢٥) تنشأ الرابطة الهيدروجينية بين جزيئات الماء نتيجة تجاذب

- أ) ذرة أكسجين جزيء ماء مع ذرة أكسجين جزيء ماء آخر .
 ب) ذرة هيدروجين جزيء ماء مع ذرة هيدروجين جزيء ماء آخر .
 ج) ذرة أكسجين جزيء ماء مع ذرة هيدروجين جزيء ماء آخر .
 د) ذرة أكسجين جزيء ماء مع ذرة هيدروجين في نفس جزيء الماء .

(أسئلة امتحانات العانظات)

٢٦) ما سبب تكوّن روابط هيدروجينية بين جزيئات الماء ؟

- أ) حجم ذرة $O < 0$ حجم ذرة H
 ب) كتلة ذرة $O < 0$ كتلة ذرة H
 ج) كثافة ذرة $O < 0$ كثافة ذرة H
 د) سالبية ذرة $O < 0$ سالبية ذرة H

(كتاب الامتحانات)

٢٧) يتشابه الماء مع كبريتيد الهيدروجين في

- أ) الكتلة الجزيئية .
 ب) درجة الغليان .
 ج) وجود الروابط الهيدروجينية .
 د) تركيب الجزيء .

(أسئلة امتحانات العانظات)

٢٨) عند تسخين عينة من الماء النقي حتى درجة الغليان ، تنكسر الروابط

- أ) التساهمية فتتحرر جزيئات الماء في صورة بخار .
 ب) التساهمية فتتفصل ذرات الهيدروجين عن ذرات الأكسجين .
 ج) الهيدروجينية فتتحرر جزيئات الماء في صورة بخار .
 د) الهيدروجينية فتتفصل ذرات الهيدروجين عن ذرات الأكسجين .

(أسئلة امتحانات العانظات)

٢٩) عند الضغط الجوي العتاد ، درجة غليان الماء النقي H_2O أعلى من درجة غليان كبريتيد الهيدروجين H_2S بمقدار

- أ) $100^\circ C$ ب) $-100^\circ C$ ج) $39^\circ C$ د) $161^\circ C$

(كتاب الامتحانات)

٣٠) عند اذابة ملح كلوريد الأمونيوم في الماء

- أ) يحدث تحلل مائي ويصبح المحلول حامضياً .
 ب) يحدث تحلل مائي ويصبح المحلول قاعدياً .
 ج) يتفكك الملح ولكن لا يحدث تحلل مائي .
 د) لا يتفكك الملح ولا يحدث تحلل مائي .

(أسئلة الوزارة)

٣١) عند اذابة ملح بيكربونات الصوديوم في الماء يصبح المحلول

- أ) حمضي . ب) قاعدي . ج) متعادل . د) متردد .

(كتاب الامتحانات)

٣٢) أي المحاليل التالية يكون له أكبر قيمة pH ؟

- أ) محلول بيكربونات الأمونيوم .
 ب) محلول حمض الأمستيك .
 ج) محلول بيكربونات البوتاسيوم .
 د) محلول ملح الطعام .





Sheet

علوم - متكاملة - نرم - أول

(أسئلة امتحانات العانظات)

٣٣) أى مما يلى ينتج عن ذوبان بيكرينات الصوديوم فى الماء ؟

- ١) نقص تركيز OH^- ٢) زيادة تركيز H^+ ٣) نقص قيمة pH ٤) زيادة قيمة pH

٣٤) عند اذابة ملح بيكرينات البوتاسيوم فى كمية مناسبة من الماء القطر ،

تزداد قيمة الرقم الهيدروجينى "pH" نتيجة

(أسئلة امتحانات العانظات)

- ١) زيادة تركيز أيونات H^+ ٢) زيادة تركيز أيونات OH^-
٣) نقص تركيز أيونات OH^- ٤) نقص تركيز كل من أيونات H^+ و OH^-

٣٥) عند تخفيف محض الهيدروكلوريك المركز (HCl)

تزداد قيمة الرقم الهيدروجينى نتيجة

(أسئلة امتحانات العانظات)

- ١) زيادة تركيز أيونات Cl^- ٢) زيادة تركيز أيونات Cl^- ٣) زيادة تركيز أيونات H^+ ٤) نقص تركيز أيونات H^+

٣٦) عند اذابة ملح مجهول فى الماء أدى ذلك الى خفض تركيز أيونات OH^- فيه ،

ما استنتاجك عن طبيعة محلول الملح المجهول ؟

(كتاب الامتحان)

- ١) حمضي . ٢) قاعدي . ٣) متعادل . ٤) متردد .

(أسئلة الوزارة)

٣٧) محاليل الأملاح التالية متساوية التركيز ، فى أى منها يكون تركيز أيون الهيدروجين هو الأكبر ؟

- ١) KCl ٢) NH_4Cl ٣) NH_4HCO_3 ٤) NaHCO_3

٣٨) النسبة بين تركيز أيونات الهيدروجين فى كمية معينة من الماء الى تركيز أيونات الهيدروجين بعد اذابة 10 g من

(كتاب الامتحان)

ملح كلوريد الأمونيوم فى هذه الكمية من الماء

- ١) أكبر من الواحد الصحيح . ٢) أقل من الواحد الصحيح .
٣) تساوي الواحد الصحيح . ٤) تساوى 7

(كتاب الامتحان)

٣٩) النسبة بين تركيز أيونات H^+ الموجبة فى محلول حمضي الى تركيزها فى محلول قاعدي :

- ١) أكبر من الواحد الصحيح . ٢) أقل من الواحد الصحيح .
٣) تساوي الواحد الصحيح . ٤) تساوى 7

٤٠) المحلول الذى يكون تركيز أيونات H^+ فيه أقل من تركيز أيونات OH^- فيه ،

(أسئلة امتحانات العانظات)

يكون محلولاً

- ١) حمضياً وقيمة pH له أقل من 7 ٢) حمضياً وقيمة pH له أكبر من 7
٣) قاعدياً وقيمة pH له أقل من 7 ٤) قاعدياً وقيمة pH له أكبر من 7

٤١) لديك محلول ملح مجهول قيمة الرقم الهيدروجينى له 5.3

(كتاب الامتحان)

فمن المحتمل أن يكون هذه المحلول ملح

- ١) كلوريد الصوديوم . ٢) بيكرينات الصوديوم . ٣) كلوريد الأمونيوم . ٤) بيكرينات الأمونيوم .





Sheet

علوم - متكاملة - نرم - أول

٤٣) إذا كانت قيمة pH لمحلول ما تساوي 12.5

(كتاب الامتحانات)

فمن المحتمل أن يكون هذه المحلول للمح

- ١) محض هيدروكلوريك . ٢) ماء نقي . ٣) هيدروكسيد الصوديوم . ٤) بيكربونات الأمونيوم .

٤٣) عند إضافة قطرات من محض الكبريتيك إلى كمية من الماء القطر ،

(أسئلة امتحانات العانظات)


تتغير قيمة pH للمحلول الناتج تصبغ

- ١) 12 ٢) 5 ٣) 7 ٤) 8

٤٤) ما الشكل البياني الذي يعبر تعبيراً صحيحاً عن العلاقة بين تركيز كل من أيونات H^+ وأيونات OH^- مع


(أسئلة امتحانات العانظات)

استمرارية إذابة الزيد من كلوريد الأمونيوم في الماء ؟



(كتاب الامتحانات)

٤٥) أي الأشكال البيانية التالية يوضع العلاقة بين قيمة pH للمحلول وتركيز أيون H^+ فيه ؟



٤٦) أي مما يلي يعبر عن العلاقة بين أيونات الهيدروكسيد OH^- وأيونات الهيدروجين H^+ في كل من محلول

(كتاب الامتحانات)

لكلوريد الأمونيوم ومحلول بيكربونات الصوديوم ؟

محلول بيكربونات الصوديوم	محلول لكلوريد الأمونيوم	
$OH^- < H^+$	$OH^- > H^+$	١)
$OH^- > H^+$	$OH^- < H^+$	٢)
$OH^- = H^+$	$OH^- > H^+$	٣)
$OH^- > H^+$	$OH^- = H^+$	٤)

(أسئلة امتحانات العانظات)

٤٧) بنصح المريض الذي يعاني من فرط إفراز حمض المعدة بتناول

- ١) علاج مناسب بخفض قيمة pH ٢) علاج مناسب برفع قيمة pH
٣) أطعمة تزيد من تركيز أيونات H^+ ٤) مياه غازية تحتوي على نسبة من CO_2



01026675233

9

إعداد: أ / أحمد شاهين





Sheet

علوم - متكاملة - نرم - أول

٤٨) المعادلة التالية تعبر عن تميؤ ملح XY : $XY_{(s)} + H_2O_{(l)} \longrightarrow HY_{(aq)} + X^{+}_{(aq)} + OH^{-}_{(aq)}$

(كتاب الامتحانات)


١٠ د

٧ ج

٦ ب

٤ ا

٤٩) تمثل المعادلة الكيميائية التالية التعلل المائي للملح (WZ) :



(أسئلة الوزارة)


٨ د

٧ ج

٦ ب

٥ ا

٥٠) عند إذابة نترات الأمونيوم NH_4NO_3 في الماء يتفكك المركب كما في المعادلة التالية :



إذا علمت أن أيون النترات (NO_3^{-}) مشتق من حمض قوي ،

فأي الاستنتاجات الآتية أدق علمياً عن المحلول الناتج من الذوبان في الماء ؟

(كتاب المضواء)

١) المحلول حمضي . ٢) المحلول قاعدي . ٣) المحلول متعادل . ٤) المحلول قلوي .

٥١) أي مما يلي صحيح عن الحمض والقاعدة الناتجت عن ذوبان ملح كلوريد الأمونيوم في الماء ؟

القاعدة الناتجة	الحمض الناتج	
قوية	قوي	١
ضعيفة	ضعيف	٢
ضعيفة	قوي	٣
قوية	ضعيف	٤

٥٢) عند إضافة قطرات من محلول هيدروكسيد الصوديوم NaOH إلى محلول حمض من حمض الهيدروكلوريك HCl

(أسئلة امتحانات العانظات)

قيمة (pH = 3) ، فإن قيمة pH للمحلول الناتج تساوي

٢ د

٣ ج

٤ ب

١ ا

٥٣) عند ذوبان ملح بيكربونات الصوديوم في الماء ، فإن :

(أسئلة الوزارة)

تركيز أيون الهيدروكسيل	تركيز أيون الهيدروجين	
يقل	يقل	١
لا يتغير	لا يتغير	٢
يقل	يزداد	٣
يزداد	يقل	٤



01026675233

10

إعداد : أ / أحمد شاهين





Sheet

علوم - متكاملة - نرم - أول

(كتاب الاضواء)

٥٤) التوازن الحمضي والقاعدي في الماء يعتمد على

- ٢) قطبية الماء .
 ٣) ارتفاع درجة غليان الماء .
 ٤) العلاقة بين تركيز أيونات H^+ وأيونات OH^-
 ٥) حامضية الماء الجوفي .

(كتاب الاضواء)

٥٥) عند تفاعل بخار الماء في السحب مع بعض المركبات الغازية في الهواء ينتج عنه

- ٢) زيادة الأس الهيدروجيني لاء الطر .
 ٣) انطار قلبية .
 ٤) زيادة تركيز أيونات الهيدروكسيد في ماء الطر .
 ٥) زيادة تركيز أيونات الهيدروجين في ماء الطر .

(أسئلة الوزارة)

- ٥٦) أي مما يلي يعبر عن كتلة ومجموع الغازين اللازمين لتكوين الماء في معدل الضغط ودرجة الحرارة ؟
 ٢) O_2 أقل كتلة وأكبر حجماً .
 ٣) H_2 أقل كتلة وحجماً .
 ٤) O_2 أكبر كتلة وأقل حجماً .
 ٥) H_2 أكبر كتلة وحجماً .

المحلول	تركيز H^+ (M)	تركيز OH^- (M)
(X)	10^{-3}	10^{-11}
(Y)	10^{-9}	10^{-5}
(Z)	10^{-7}	10^{-7}

- ٥٧) من الجدول المقابل : أي الاختيارات التالية يعد صحيحاً بالنسبة لهذه المحاليل ؟
 ٢) المحلول (X) قاعدي .
 ٣) المحلول (Z) حمضي .
 ٤) المحلول (Y) حمضي .
 ٥) المحلول (Y) قاعدي .

(أسئلة الوزارة)

٥٨) ماذا يحدث عند / ذوبان بيكربونات الصوديوم في الماء (بالنسبة لتركيز أيونات H^+ وتركيز أيونات OH^-) ؟

(أسئلة الوزارة)


٥٩) علل / الماء مذيب قطبي ؟

(أسئلة الوزارة)

٦٠) علل / المحلول الناتج عن التحلل المائي لمحج بيكربونات الصوديوم في الماء محلولاً قلوياً ؟

(كتاب الاضواء)

٦١) أدرس الشكل المقابل جيداً ، ثم أجب :



١) حدد الرقم الدال على الروابط التساهمية ، وأذكر عددها ؟

٢) حدد الرقم الدال على الروابط الهيدروجينية ، وأذكر عددها ؟

٣) كم جزيء ماء في الشكل ؟




01026675233

11

إعداد : أ / أحمد شاهين





Sheet

علوم - متكاملة - نرم - أول

الدرس الثالث / الخواص الفيزيائية للماء

الشفة

(أسئلة الوزارة)

١) لقياس كثافة السوائل يستخدم جهاز

- ☐ أ) الهيدروميتر .
☐ ب) الباروميتر .
☐ ج) الترمومتر .
☐ د) الانومتر .

(أسئلة امتحانات العانظات)

٢) تدريج الهيدروميتر

- ☐ أ) يشير التدريج السفلى الى الصفر .
☐ ب) يشير التدريج العلوى الى الصفر .
☐ ج) يشير التدريج السفلى الى أقل كثافة بقيسها .
☐ د) يشير التدريج العلوى الى أقل كثافة بقيسها .

(أسئلة الوزارة)

٣) في الهيدروميتر تكون وظيفة :

التعريف الواسع	الزئبق
الطفرة	الانزات الرأسى
الطفرة	الطفرة
الانزات الرأسى	الطفرة
الانزات الرأسى	الانزات الرأسى

(أسئلة امتحانات العانظات)

٤) في الهيدروميتر تكون كثافة السائل مرتفعة كلما :

- ☐ أ) زاد حجم الجزء الغمر منه في السائل .
☐ ب) قل حجم الجزء الغمر منه في السائل .
☐ ج) قل معامل التصاف السائل بالزجاج .
☐ د) كانت درجة حرارة السائل مرتفعة .



٥) قام طالب بتجربة لتعيين الكثافة لثلاثة سائل K , L , M

باستخدام جهاز الهيدروميتر ، وحصل على ارتفاعات مختلفة للسائل الزجاجى كما هو موضح بالرسم ، فإن الترتيب الصحيح لكثافات السائل الثلاثة (كتاب الامتعات)

$L > M > K$ د)

$M > L > K$ ج)

$K > M > L$ ب)

$K > L > M$ أ)



X

Y

Z

٦) يوضع الشكل المقابل : ثلاث ألواب بها ماء مختلف اللوحة ،

عند نفس درجة الحرارة ، ودفع بكل منها بيضة (والبيض متماثل تماماً) .

فإن ترتيب الماء حسب الكثافة (أسئلة الوزارة)

$X > Y > Z$ ب)

$X = Y = Z$ أ)

$Z > Y = X$ د)

$Z > Y > X$ ج)

(أسئلة الوزارة)

٧) أى من المواد التالية يمكن استخدامها بحيث تساعد على الانزات في الهيدروميتر ؟

- ☐ أ) الزئبق أو الرصاص .
☐ ب) النيكل أو الكروم .
☐ ج) البلاتين أو الأليديوم .
☐ د) البرونز أو الفوسفور .



01026675233

12

إعداد : أ / أحمد شاهين





Sheet

علوم - متكاملة - نرم - أول

٨) أي كوب من الأكواب الموضحة يحتوي على ماء أكبر كثافة ؟



٩) ما هي ملوحة المحلول الناتج عن إذابة 70 g من ملح الطعام في كوب من الماء النقي وأكمل حجم المحلول إلى 2 L ؟

(أسئلة الوزارة)

د) 17.5 g/L

ج) 35 g/L

ب) 140 g/L

پ) 70 g/L

(أسئلة امتحانات العانظات)

١٠) ملوحة ماء المصيط 35 g/L تعني أن :

ب) كل 1 g من المحلول تحتوي 35 L من الملح .

پ) كل 1 L من المحلول تحتوي 35 g من الملح .

د) كل 35 L من المحلول تحتوي 1 g من الملح .

ج) كل 35 g من المحلول تحتوي 1 L من الملح .

(أسئلة الوزارة)

١١) أي العلاقات التالية يمكن استخدامها لحساب ملوحة محلول مائي ؟

$$\text{ب) الملوحة} = \frac{\text{كتلة الملح الذائب في الماء}}{\text{حجم المحلول}}$$

$$\text{پ) الملوحة} = \frac{\text{كتلة الملح}}{\text{حجم المحلول}}$$

$$\text{د) الملوحة} = \frac{\text{حجم المحلول}}{\text{كتلة الملح الذائب في الماء}}$$

$$\text{ج) الملوحة} = \text{كتلة الملح الذائب في } x \text{ حجم المحلول}$$

١٢) أصب كتلة ملح الطعام اللازم إضافته إلى كوب من الماء النقي وأكمل حجم المحلول إلى 0.25 L بحيث تكون ملوحة المحلول 35 g/L ؟

(أسئلة الوزارة)

د) 70 g

ج) 35 g

ب) 17.5 g

پ) 8.75 g

(أسئلة امتحانات العانظات)

١٣) أي من التغيرات التالية تسبب نقص كثافة ماء درجة حرارته 2°C ؟

ب) خفض درجة حرارته بمقدار 1°C

پ) خفض درجة حرارته بمقدار 4°C

د) تعريضه لضغط مرتفع جداً مع ثبوت درجة حرارته .

ج) إذابة ملح الطعام فيه .

(أسئلة الوزارة)

١٤) تنقل التيارات المائية :

پ) الحرارة من قطبي الكرة الأرضية إلى المناطق الاستوائية . ب) العناصر الغذائية من سطح المحيط إلى القاع .

د) الملح من قطبي الكرة الأرضية إلى المناطق الاستوائية . ج) العناصر الغذائية من ناع المحيط إلى السطح .



01026675233

13

إعداد : أ / أحمد شاهين






Sheet

علوم - متكاملة - نرم - أول

١٥) أي الأشكال التفاضلية التالية تم رسم الاسم بشكل صحيح بحيث توضح اتجاه انتقال الحرارة والأملاح بواسطة التيارات الهوائية ؟
(أسئلة الوزارة)



١٦) الاتجاه الذي تنقل فيه التيارات المائية :

العناصر الغذائية	الحرارة والأملاح	
من سطح المحيط إلى القاع	من المناطق الاستوائية إلى قطبي الكرة الأرضية	أ
من قاع المحيط إلى السطح	من المناطق الاستوائية إلى قطبي الكرة الأرضية	ب
من قاع المحيط إلى السطح	من قطبي الكرة الأرضية إلى المناطق الاستوائية	ج
من سطح المحيط إلى القاع	من قطبي الكرة الأرضية إلى المناطق الاستوائية	د

١٧) ما هو الدور الرئيسي للتيارات المائية في المحيطات ؟

- أ) نقل المياه العذبة من السطح إلى أعماق المحيط .
 ب) نقل العناصر الغذائية من السطح إلى قاع المحيط .
 ج) نقل الجليد المنصهر إلى أماكن مختلفة .
 د) نقل الملح من المناطق القطبية إلى المناطق الاستوائية .

١٨) أربع عينات من الماء كتلة كل منها 1 Kg ، فأي منها يكون حجمه أكبر ؟

- أ) ماء مالح عند درجة حرارة 4°C
 ب) ماء عذب عند درجة حرارة 4°C
 ج) ماء مالح عند درجة حرارة 8°C
 د) ماء عذب عند درجة حرارة 8°C

١٩) وضع هيدروميتر في إناء به عينة من ماء بحر فكان طول الجزء الغمر منه في الماء يساوي 5 cm ، عند إضافة ماء مقطر إلى العينة الموجودة بالإناء ، فإن طول الجزء الغمر من الهيدروميتر في الماء يمكن أن يساوي
 أ) 7 cm ب) 5 cm ج) 3 cm د) 1 cm

٢٠) يكون حجم الماء أقل قوة له عند درجة حرارة

- أ) 0°C ب) 2°C ج) 4°C د) 100°C

٢١) يؤثر الماء على العديد من الظواهر الطبيعية، ويرجع ذلك إلى

- أ) الحرارة النوعية المنخفضة للماء .
 ب) الحرارة النوعية المرتفعة للماء .
 ج) ارتفاع كثافته عند التجمد .
 د) انخفاض نسبة اللزوجة في مياه المحيطات .



01026675233

14

إعداد: أ / أحمد شاهين





Sheet

علوم - متكاملة - نرم - أول

(كتاب الأضواء)

٢٢) النسبة بين كثافة الماء عند درجة حرارة 0°C الى كثافة الماء عند درجة حرارة 4°C

- Ⓐ أقل من الواحد الصحيح .
 Ⓑ أكبر من الواحد الصحيح .
 Ⓒ تساوى الواحد الصحيح .
 Ⓓ لا توجد إجابة صحيحة .

(كتاب الأضواء)

٢٣) تتأثر كثافة مياه البحار والعيطات بكل مما يأتى ، ما عدا

- Ⓐ الضغط داخل الماء .
 Ⓑ كمية الأملاح الذابة فى الماء .
 Ⓒ شدة الضوء .
 Ⓓ درجة حرارة الماء .

(كتاب الأضواء)

٢٤) اذا زادت كتلة الجسم للضعف ، فإن كثافته

- Ⓐ تزداد للضعف .
 Ⓑ تقل للنصف .
 Ⓒ تظل ثابتة .
 Ⓓ تقل للربع .

٢٥) كمية من ماء نقي حجمها 1 m^3 عند درجة حرارة 4°C تم تبريدها حتى تجسدت ، فإن مقدار الزيادة فى حجم هذه

(أسئلة امتحانات العانظات)

الكمية عند تحولها الى ثلج كثافته 917 Kg/m^3 يساوى تقريباً

- Ⓐ 0.03 m^3 Ⓑ 0.045 m^3 Ⓒ 0.06 m^3 Ⓓ 0.09 m^3

(كتاب الأضواء)


٢٦) كل مما يأتى من أسباب حركة التيارات البحرية ، ما عدا

- Ⓐ الاختلاف فى كثافة المياه .
 Ⓑ تغير نسبة اللوحة .
 Ⓒ اختلاف درجات الحرارة .
 Ⓓ أعداد الكائنات الحية .

٢٧) شريحة معدنية مربعة تم قطع ربعها كما هو موضح بالشكل ،

(كتاب الامتحانات)

فإن نسبة كثافة مادة الجزء (X) الى كثافة مادة الجزء (Y) تساوى



- Ⓐ $\frac{1}{2}$ Ⓑ $\frac{1}{4}$ Ⓒ $\frac{1}{12}$ Ⓓ $\frac{4}{12}$

٢٨) صب سائل عند درجة حرارة معينة داخل اناء اسطواني الشكل حتى وصل السائل الى منتصف البداء وتم تعيين

كثافة السائل فكانت (ρ) ، فإذا صب مزيد من نفس السائل عند نفس الحرارة ليمتلأ البداء تماماً ،

(أسئلة امتحانات العانظات)


فإن كثافة السائل بالبداء تساوى

- Ⓐ $\frac{1}{2}\rho$ Ⓑ 2ρ Ⓒ $\frac{3}{2}\rho$ Ⓓ ρ

٢٩) الشكل البياني الذى يمثل العلاقة بين الكثافة (ρ) للماء النقي

(أسئلة امتحانات العانظات)

والكتلة (m) لعينات منه عند درجة حرارة 50°C هو



01026675233

15

إعداد : أ / أحمد شاهين





Sheet

علوم - متكاملة - نرم - أول

٣٠) إذا علمت أن الكثافة النسبية للزئبق أكبر من الكثافة النسبية للكحول عند نفس درجة الحرارة ، فإن نسبة كتلة 1 cm^3 من الزئبق إلى كتلة نفس الحجم من الكحول تكون (أسئلة امتحانات العاقلات)

- أ) أقل من الواحد .
- ب) أكبر من الواحد .
- ج) مساوية للواحد .
- د) لا توجد تحديد إجابة .

٣١) التمدد السائل للماء يكون عند : (أسئلة امتحانات العاقلات)


- أ) رفع درجة حرارته من 0°C إلى 4°C
- ب) رفع درجة حرارته من 4°C إلى درجة حرارة الغرفة .
- ج) خفض درجة حرارته من 4°C إلى 0°C
- د) رفع درجة حرارته من درجة حرارة الغرفة إلى 4°C

٣٢) الكثافة النسبية لاء البحر 1.025 ، وهذا يعني أن كثافة ماء البحر تساوي (أسئلة الوزارة)

بوحدة kg/m^3	بوحدة g/cm^3	
1.025	1.025	أ)
1025	1025	ب)
1025	1.025	ج)
1.025	1025	د)

٣٣) من الشكل الوضع برجع سبب اختلاف كثافة الماء (1)

عن الماء (2) إلى اختلاف (أسئلة الوزارة)



- أ) الكتلة الجزيئية .
- ب) درجة الحرارة .
- ج) الحجم الجزيئي .
- د) الروابط بين الذرات .

٣٤) من الشكل البيان الوضع يمكن استنتاج أن (أسئلة الوزارة)



- أ) كثافة الماء تزداد برفع درجة الحرارة عن 4°C
- ب) كثافة الماء تنخفض بخفض درجة الحرارة عن 4°C
- ج) حجم الماء يقل بخفض درجة الحرارة عن 4°C
- د) حجم الماء يقل بزيادة درجة الحرارة عن 4°C

٣٥) عند دخول مياه الأنهار الجليدية المنصهرة إلى محيط الهيط ، فإنهما (أسئلة امتحانات العاقلات)

- أ) يمتزجان لأن كلا منهما ماء سائل له نفس الكثافة .
- ب) لا يمتزجان ويطفو الماء المالح على سطح الماء العذب .
- ج) لا يمتزجان ويطفو الماء العذب على سطح الماء المالح .
- د) يمتزجان لأنهما سائلين مختلفي الكثافة .






Sheet


علوم - متكاملة - نرم - أول

(أسئلة الوزارة)


٣٦) أي الأشكال التفاضلية التالية توضع بشكل صحيح درجات الحرارة لبحيرة في منطقة قطبية ؟




ب



د



ج



ا

(أسئلة امتحانات العانظات)

٣٧) تزداد كثافة المياه في المحيطات بزيادة كل مما يأتي ، ما عدا

- ١) عمق المحيط . ٢) تقارب جزيئات الماء . ٣) ملوحة المياه . ٤) درجة الحرارة .

(أسئلة الوزارة)

٣٨) تعد الاختلافات في كثافة المياه أحد أسباب نقل كل مما يأتي ، ما عدا

- ١) كمية الحرارة . ٢) الملح . ٣) العناصر الغذائية . ٤) الضور .

(أسئلة امتحانات العانظات)

٣٩) أي مما يلي أقل كثافة ؟

- ١) ماء عذب سائل . ٢) ماء عذب متجمد . ٣) ماء مالح بارد . ٤) ماء مالح ساخن .

(أسئلة الوزارة)

٤٠) الماء يشبه جميع السوائل في التمدد بالحرارة والانكماش بالبرودة عند درجة حرارة

- ١) 0°C ٢) 4°C ٣) أعلى من 4°C ٤) ما بين 0°C و 4°C

(أسئلة امتحانات العانظات)

٤١) أعلى درجة حرارة للماء السائل في المناطق القطبية تكون :

- ١) في السطح وتساوي 1°C ٢) في السطح وتساوي 4°C ٣) في العمق وتساوي 1°C ٤) في العمق وتساوي 4°C

٤٢) سطح مائي ضحل يمارس عليه رياضة التزلج على الجليد وصيد الأسماك ،

(أسئلة امتحانات العانظات)

ما هي درجة الحرارة الترفعة للماء في أسفل القاع ؟

- ١) 4°C ٢) أقل من 4°C ٣) 0°C ٤) تحت 0°C

٤٣) مكعبات متماثلات من الثلج (X) ، (Y) : وضع المكعب (X) في إناء به ماء عذب ، وتم وضع المكعب (Y) في إناء به

(أسئلة الوزارة)

ماء شديد اللوحة ، فمن التوقع

- ١) انصهار المكعبين خلال نفس الفترة الزمنية . ٢) انصهار المكعب (X) خلال فترة زمنية أقل . ٣) انصهار المكعب (Y) خلال فترة زمنية أقل . ٤) ذوبان المكعب (X) ، بينما المكعب (Y) لا يذوب .



01026675233

17

إعداد : أ / أحمد شاهين





Sheet

علوم - متكاملة - نرم - أول

٤٤) ماذا يحدث لكثافة الماء أثناء انصهار الثلج ؟


- ١) تزداد ثم تتناقص . ٢) تتناقص ثم تزداد . ٣) لا تتغير . ٤) لا يمكن تحديد إجابة .

٤٥) مكعب مصمت طول ضلعه 2 cm ، وعند وضعه على ميزان كانت قراءته 21.6 g

(كتاب الامتحانات)

فإن كثافة مادة المكعب تساوي

- ١) 2700 Kg/m³ ٢) 3600 Kg/m³ ٣) 5400 Kg/m³ ٤) 10800 Kg/m³




٤٦) يوضع الشكل التاليين متماثلين أحدهما به ماء نقي والآخر به سائل ، فإذا كانت كفتا الميزان متزنيتين في مستوى أفقي واحد ،

فإن الكثافة النسبية للسائل

- ١) أكبر من الواحد الصحيح . ٢) أقل من الواحد الصحيح . ٣) تساوي الواحد الصحيح . ٤) لا يمكن تحديد إجابة .

٤٧) الشكل المقابل : يمثل أبعاد جسمين مصمتين A ، B

لهما نفس الكتلة ، فإن الجسمين كثافة مادته أكبر ؟



(كتاب الامتحانات)

- ١) الجسم A ٢) الجسم B ٣) متساوية لكلا الجسمين . ٤) لا يمكن تحديد إجابة .

٤٨) وضعت كمية من الماء النقي درجة حرارتها 3°C في مجهر التلاصقة ،

(أسئلة الوزارة)

أي الاختبارات التالية صحيحة ؟

الكتلة	الحجم	الكثافة	هزئئات الماء	
تقل	يقل	لا تتغير	تقترب من بعضها	١)
تقل	يزداد	لا تتغير	تبتعد عن بعضها	٢)
يزداد	يزداد	تزداد	تقترب من بعضها	٣)
يزداد	يقل	تزداد	تبتعد عن بعضها	٤)

٤٩) اناءان متماثلان ١ ، ٢ بهما كميتان متساويتان من الماء النقي عند درجتى حرارة t₁ ، t₂ على الترتيب ،

ارتفعت درجتى حرارة الاناءين درجة سيليزية واحدة فزادت كثافة الماء في الاناء ١ بينما قلت كثافة الماء في الاناء ٢ ،

(كتاب الامتحانات)

فإن مما يلي يمكن أن يمثل درجتى الحرارة t₁ ، t₂ على الترتيب ؟

- ١) 3°C ، 1°C ٢) 6°C ، 4°C ٣) 3°C ، 6°C ٤) 6°C ، 3°C

(كتاب الامتحانات)

٥٠) أي العوامل التالية لا يؤثر بشكل مباشر على التيارات المائية في المحيط ؟

- ١) اختلاف درجة ملوحة الماء . ٢) اختلاف درجة حرارة الماء . ٣) اختلاف ضغط الماء . ٤) اختلاف أنواع الكائنات البحرية .





Sheet

علوم - متكاملة - نرم - أول

٥١) أي من الراضع التالية تكون البياه عندها لها كثافة أعلى ،

وذلك عندما تكون مجموعها عند درجة حرارة 4°C ؟

(أسئلة امتحانات المافظات)

- أ) الأعماق السحيقة في المحيط .
- ب) سطح البحر .
- ج) سطح بحيرة عذبة .
- د) قاع نهر متجمد .

٥٢) بحيرة مالحه مغلقة بقل مستوى البياه بها مع مرور الوقت بسبب بخر الماء منها ،

فإن كثافة ماء البحيرة


(كتاب الامتحانات)

- أ) تزداد .
- ب) تقل .
- ج) لا تتغير .
- د) لا يمكن تحديد إجابة .

٥٣) في الشكل المقابل ثلاثة سائل لا تختلط ببعضها موضوعة في اناء واحد ،

فإن نسبة كثافة السائل (x) إلى كثافة السائل (y)

(أسئلة امتحانات المافظات)




- أ) أكبر من الواحد الصحيح .
- ب) أقل من الواحد الصحيح .
- ج) تساوي الواحد الصحيح .
- د) لا يمكن تحديد إجابة .

٥٤) أي من الأشكال البيانية التالية يمثل العلاقة بين الحجم (V) بالسلم لعينات من ماء نقي كثافته 1000 Kg/m³


والكتلة (m) بالجرام لهذه العينات ؟

(كتاب الامتحانات)




(كتاب الامتحانات)

٥٥) أي الأشكال البيانية الآتية يمثل تغير كثافة الماء النقي مع درجة الحرارة ؟



٥٦) عند رفع درجة حرارة الماء النقي من 4°C إلى 8°C ، ماذا يحدث لكل من حجم الماء وكثافته على الترتيب ؟

- أ) يزداد ، تزداد .
- ب) يقل ، تزداد .
- ج) يزداد ، تقل .
- د) يقل ، تقل .





Sheet

علوم - متكاملة - نرم - أول

٥٧) ما الذي يحدث لجزيئات الماء النقي عندما تنخفض درجة حرارته من 4°C إلى 0°C ؟ (أسئلة امتحانات المناظرات)

- ١) تقترب من بعضها .
 ٢) تبتعد من بعضها .
 ٣) تظل ثابتة في مواضعها .
 ٤) يقل حجمها .

٥٨) كمية من الماء النقي حجمها 20 cm^3 عند درجة حرارة 4°C ، فما كتلتها ؟ (أسئلة امتحانات المناظرات)

- ١) 10 g ٢) 20 g ٣) 100 g ٤) 200 g

٥٩) كمية من الماء النقي كتلتها 100 g عند 4°C ، فإن حجمها عند 20°C يكون (أسئلة امتحانات المناظرات)

- ١) 100 cm^3 ٢) أكبر من 100 cm^3 ٣) أقل من 100 cm^3 ٤) لا يمكن تحديد إجابة .

٦٠) عند أي درجات الحرارة الآتية يكون للمتر المكعب من الماء النقي أكبر كتلة ؟ (أسئلة امتحانات المناظرات)

- ١) 4°C ٢) 10°C ٣) 25°C ٤) 80°C

٦١) عند أي درجات الحرارة الآتية يكون للمليجرام الواحد من الماء النقي أكبر حجم ؟ (أسئلة امتحانات المناظرات)

- ١) 4°C ٢) 10°C ٣) 25°C ٤) 80°C

٦٢) كمية من ماء نقي درجة حرارتها 2°C ،

أي من التغيرات الآتية لدرجة حرارتها تسبب في نقص كثافتها بمقدار أكبر ؟ (كتاب الامتحان)

- ١) رفع بمقدار 1°C ٢) خفض بمقدار 1°C ٣) رفع بمقدار 2°C ٤) خفض بمقدار 2°C

٦٣) الشكل المقابل يوضح هيدروميتر موضوع في إناء نقي ومترن ، فإذا تم إضافة ملح للماء وإذابته ، ماذا يحدث للهيدروميتر ؟ (أسئلة امتحانات المناظرات)




- ١) ينغمر منه جزء أكبر في الماء .
 ٢) يطفو منه جزء أكبر .
 ٣) لا يتغير طول الجزء الطافي منه .
 ٤) لا يمكن تحديد الإجابة .

٦٤) أي من التغيرات التالية تسبب نقص كثافة ماء درجة حرارته 2°C ؟ (أسئلة الوزارة)

- ١) خفض درجة حرارته بمقدار 4°C ٢) خفض درجة حرارته بمقدار 1°C ٣) تعريضه لضغط مرتفع جداً مع ثبوت درجة حرارته . ٤) إذابة ملح الطعام فيه .

٦٥) أي العلاقات البيانية التالية تعبر عن العلاقة بين كثافة الماء ودرجة الحرارة ؟ (كتاب الاضواء)






Sheet

علوم - متكاملة - نرم - أول

(كتاب المضراء)

٦٦) أي العلاقات البيانية التالية يوضح العلاقة بين درجة حرارة الماء وحجمه ؟



(كتاب الامتحانات)

٦٧) أكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة من العبارات الآتية :

(١) أي مادة قابلة للانسياب ولا تتخذ شكلاً ثابتاً بل تتخذ شكل الأناء الحاوي لها .

(٢) نسبة كثافة مادة معينة إلى كثافة الماء النقي عند درجة حرارة 4°C

(كتاب الامتحانات)

٦٨) ماذا يحدث عند ارتفاع درجة حرارة جسم صلب "بالنسبة لكثافته" ؟

(أسئلة امتحانات العانظات)

٦٩) علل / بدء تجمد مياه بحيرة في المناطق القطبية عند السطح بدلاً من القاع ؟

(أسئلة امتحانات العانظات)

٧٠) لديك كمية من ماء في درجة حرارة الغرفة ، كيف يمكنك زيادة كثافتها بطريقتين ؟

(أسئلة امتحانات العانظات)

٧١) إذا كانت الكثافة النسبية للالرمنيوم هي 2.7 وكثافة الماء عند 4°C هي 10^3 Kg/m^3 ، أحسب كثافة الالرمنيوم ؟

(أسئلة امتحانات العانظات)

٧٢) كمية من ماء نقي حجمها 1 m^3 عند درجة حرارة 4°C تم تبريدها حتى تجمدت ،

أحسب مقدار الزيادة في حجم هذه الكمية عند تحولها إلى ثلج كثافته 917 Kg/m^3 ؟




01026675233

21

إعداد : أ / أحمد شاهين






Sheet

علوم - متكاملة - نرم - أول

تابع الدرس الثالث / الخواص الفيزيائية للمواد

كمية الحرارة - الحرارة النوعية

١) أي الأشكال البيانية التالية يمثل العلاقة بين كمية الحرارة (Q_{th}) والكتلة (m) لعدة أجسام ؟ (كتاب الامتحانات)



٢) أي مما يلي وحدة الكتلة منها لها القدرة على تخزين الطاقة الحرارية لفترة أطول بعد غروب الشمس ؟ (أسئلة الوزارة)

- (a) البعيريات الناحية . (b) رمال الصحراء . (c) الهواء الجوي . (d) صخور الجبال .

٣) الطاقة الداخلية لكمية من الماء كتلتها 1 kg تكون أكبر عند درجة حرارة

- (a) 4°C (b) 340 K (c) 300 K (d) 20°C

٤) أي درجات الحرارة التالية يكون متوسط طاقة حركة جزيئات المادة فيها أكبر ما يمكن ؟ (كتاب الاضواء)

- (a) 0°C (b) 273 K (c) -273°C (d) 100°C

٥) أي مما يحدث لقطعة من الحديد درجة حرارتها 10°C -

عند وضعها في اناء معزل به ماء درجة حرارته 10°C ؟


(أسئلة امتحانات العانظات)

- (a) تقل الطاقة الداخلية لقطعة الحديد . (b) تزداد كثافة الحديد .
(c) تقل الحرارة النوعية للحديد . (d) تزداد سرعة جزيئات الحديد .

٦) أي الأشكال البيانية التالية يمثل العلاقة بين الحرارة النوعية (c) لعدة معين والكتلة (m)

(كتاب الامتحانات - أسئلة امتحانات العانظات)

لعدة أجسام من ذلك المعين ؟



٧) إذا كانت الحرارة النوعية للمادة (A) أعلى من الحرارة النوعية لمادة (B) ،

فماذا يمكن أن تستنتج عن سلوك هاتين المادتين عند رفع درجة حرارتهما ؟

(كتاب الاضواء)

- (a) المادة (A) ترتفع حرارتها أبطأ من المادة (B) . (b) ترتفع حرارة المادتين بنفس السرعة .
(c) هذا العامل لن يؤثر في سرعة التسخين . (d) المادة (A) ترتفع حرارتها أسرع من المادة (B) .





- ٨) كرتان مصمتتان من النحاس والألومنيوم لهما نفس الكتلة وعند نفس درجة الحرارة ، وضعتا معا على سطح سخان كهربى لفترة زمنية متساوية كما بالشكل القابل ، فإذا علمت أن الحرارة النوعية للنحاس أقل من الحرارة النوعية للألومنيوم ، أى الكرتين تصبح درجة حرارتها أعلى في نهاية تلك الفترة ؟
- ٩) كرة النحاس . ١٠) كرة الألومنيوم . ١١) متساوية للكرتين . ١٢) لا يمكن تحديد إجابة .

- ٩) جسمان ١ ، ٢ من نفس المادة وكتلتها m_1 ، m_2 على الترتيب ، فإذا التئب كل من الجسمين كمية من الحرارة مقدارها (Q) فارتفعت درجة حرارة الجسمين بمقدار 5°C ، 10°C على الترتيب ، فإن النسبة بين كتلتى الجسمين $\left(\frac{m_1}{m_2}\right)$ تساوى

- ١) $\frac{1}{2}$ ٢) $\frac{1}{1}$ ٣) $\frac{2}{1}$ ٤) $\frac{4}{1}$

- ١٠) كتلتان متساويتان من الماء والزيت عند نفس درجة الحرارة موضعتان في اناءين متماثلين ، فإذا وضع الاناءان معا على سطح سخان كهربى فوصلت درجة حرارة الزيت الى T خلال زمن t_0 ، فإن درجة حرارة الماء تصل الى T خلال زمن (علما بأن : الحرارة النوعية للماء أكبر من الحرارة النوعية للزيت)
- ١١) أكبر من t_0 ١٢) أقل من t_0 ١٣) تساوى t_0 ١٤) لا يمكن تحديد إجابة .

- ١١) قطعة من الألومنيوم كتلتها 0.3 Kg تم تغيير درجة حرارتها من 20°C الى 253 K ، فإذا كانت الحرارة النوعية للألومنيوم 900 J/Kg.K ، فتكون قطعة الألومنيوم قد

- ١) اكتسبت كمية من الحرارة قدرها 10800 J ٢) التئبت كمية من الحرارة قدرها 62700.3 J ٣) فقدت كمية من الحرارة قدرها 10800 J ٤) فقدت كمية من الحرارة قدرها 62700.3 J

- ١٢) كرة من الألومنيوم كتلتها 10 g ودرجة حرارتها t_0 سخنت فالتئبت كمية من الحرارة مقدارها 750 J لترتفع درجة حرارتها الى درجة غليان الماء النقي ، فإذا علمت أن الحرارة النوعية للألومنيوم 900 J/Kg.K ، فإن درجة الحرارة الابتدائية للكرة (t_0) هى

- ١) 20°C ٢) 30°C ٣) 80°C ٤) 100°C

- ١٣) يطلق على الطاقة الحرارية التي تنتقل من الأجسام الساخنة الى الأجسام الباردة (كتاب الامتحانات)
- ١) درجة الحرارة . ٢) الحرارة النوعية . ٣) كمية الحرارة . ٤) الطاقة الداخلية .

- ١٤) تكون قيمة الحرارة النوعية للماء أكبر ما يمكن في الحالة (كتاب الامتحانات)
- ١) الصلبة . ٢) السائلة . ٣) الغازية . ٤) البخارية .

- ١٥) أى زوج من الكميات الفيزيائية الآتية يقاس بنفس الوحدة ؟ (أسئلة امتحانات العاقلات)
- ١) كمية الحرارة ودرجة الحرارة . ٢) الحرارة النوعية ودرجة الحرارة . ٣) كمية الحرارة والطاقة الداخلية . ٤) الطاقة الداخلية ودرجة الحرارة .





Sheet

علوم - متكاملة - نرم - أول

١٦ مادتان مختلفتان (X, Y) لهما كتلتان متساويتان ، ثم أساجهما نفس كمية الحرارة فارتفعت درجة حرارة (X) بمقدار 10°C وارتفعت درجة حرارة (Y) بمقدار 5°C ، فهذا يعني أن

(كتاب الأضواء)

- Ⓐ الحرارة النوعية ل (X) = خمس الحرارة النوعية ل (Y) . Ⓑ الحرارة النوعية ل (X) ضعف الحرارة النوعية ل (Y) .
 Ⓒ الحرارة النوعية ل (X) نصف الحرارة النوعية ل (Y) . Ⓓ الحرارة النوعية ل (X) = الحرارة النوعية ل (Y) .

١٧ كمية معينة من مادة ارتفعت درجة حرارتها من 30°C إلى 310 K

(كتاب الامتحانات)

فإن مقدار التغير في درجة الحرارة يساوي

- Ⓐ 7 K Ⓑ 37°C Ⓒ 280 K Ⓓ 280°C

١٨ عند أي درجة حرارة تساوي قيمة كتلة عينة من الماء القطر بوحدة (الجرام)

(أسئلة امتحانات المانظفات)

مع قيمة حجم العينة بوحدة (سم^٣) ؟

- Ⓐ 100°C Ⓑ 373 K Ⓒ 277 K Ⓓ 273°C

١٩ جسم درجة حرارته 220 K تم تغيير درجة حرارته حتى أصبحت -3°C

(أسئلة الوزارة)

فإن متوسط طاقة حركة جزيئات الجسم

- Ⓐ يزداد . Ⓑ يقل . Ⓒ لا يتغير . Ⓓ لا يمكن تحديد إجابة .

٢٠ إذا زادت كمية الحرارة التي يكتسبها جسم إلى الضعف ، فإن حرارته النوعية

(كتاب الامتحانات)

- Ⓐ تزداد للضعف . Ⓑ تقل للنصف . Ⓒ تظل ثابتة . Ⓓ تقل للربع .

٢١ إذا علمت أن الحرارة النوعية للزجاج بوحدة $\text{J/Kg}^{\circ}\text{C}$ تساوي 840

(أسئلة امتحانات المانظفات)

فإنها تكافئ بوحدة J/Kg.K

- Ⓐ 1113 Ⓑ 840 Ⓒ 567 Ⓓ 3.08

٢٢ أكتسب جسم كتلته 150 g كمية من الحرارة قدرها 8100 J

فارتفعت درجة حرارته من 30°C إلى 90°C

(كتاب الامتحانات)

مستعيناً بالجدول المقابل ، ما مادة هذا الجسم ؟

- Ⓐ النحاس . Ⓑ الألومنيوم .
 Ⓒ الحديد . Ⓓ الرصاص .

٢٣ ترمج استدامة الحياة البحرية لذوات الدم البارد في أعماق السطحات المائية إلى

(كتاب الأضواء)

- Ⓐ ارتفاع ضغط الماء . Ⓑ ارتفاع الحرارة النوعية للماء .
 Ⓒ ارتفاع ملوحة الماء . Ⓓ ارتفاع كثافة الماء .

٢٤ درجة تجمد الماء النقي تساوي

(أسئلة الوزارة)


- Ⓐ -273°C Ⓑ 273°C Ⓒ 0 K Ⓓ 273 K





Sheet

علوم - متكاملة - نرم - أول



شكل (1)

شكل (2)

٢٥) يمتزج اناء على 325 g من الماء كما بالشكل (1)،

فإذا علمت أن الحرارة النوعية للماء هي 4200 J/Kg.K

فإن كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة الماء لتصبح كما

بالشكل (2) هي (أسئلة امتحانات المافظات)

81900 J (ب)

38220 J (پ)

121485 J (د)

95550 J (ج)

٢٦) جسم كتلته 2 Kg ودرجة حرارته 27°C والحرارة النوعية لمادته $2 \times 10^3 \text{ J/Kg.K}$ النسب كمية من الحرارة مقدارها


10^4 J ، فإن درجة حرارة الجسم (أسئلة امتحانات المافظات)

325°C (ب) تزيد إلى

325 K (پ) تزيد إلى

5 K (د) تزداد بمقدار

2.5 K (ج) تزداد بمقدار



٢٧) كميّتان من سائلين A , B لهما نفس الكتلة ثم تسخينهما

من درجة حرارة t_0 ، والشكل البياني المقابل يوضح العلاقة بين

كمية الحرارة (Q_{th}) التي اكتسبها كل سائل ودرجة حرارته (t) ،

أي السائلين حرارته النوعية أكبر؟ (كتاب الامتحانات)

(ب) السائل (B)

(پ) السائل (A)

(ج) السائلان لهما نفس الحرارة النوعية . (د) لا يمكن تحديد الإجابة .

٢٨) كتلة (m) من الحديد اكتسبت كمية من الحرارة مقدارها (X) جول فارتفعت درجة حرارتها من 20°C إلى 50°C

فإذا اكتسبت كتلة (m) من الماء نفس كمية الحرارة (X) جول ، فإن درجة حرارتها ترتفع بمقدار : (كتاب الامتحانات)

30°C (پ) أكبر من 30°C (ب) أقل من 30°C (ج) لا يمكن تحديد إجابة . (د)

المادة	الحرارة النوعية لها ($\text{J/kg.}^\circ\text{C}$)
W	450
X	390
Y	900
Z	128

٢٩) الجدول المقابل : يوضح الحرارة النوعية لأربع مواد مختلفة (Z , Y , X , W)

فعند اكتساب نفس كمية الحرارة لأجسام من تلك المواد لها كتل متساوية ، فإن

مادة الجسم الذي ترتفع درجة حرارته بمقدار أكبر هي (كتاب الامتحانات)

X (ب)

W (پ)

Z (د)

Y (ج)

٣٠) كمية من الماء كتلتها 0.5 Kg تم تسخينها بحيث تكتسب كمية حرارة بمعدل 42000 J في الدقيقة ، فإذا كانت الحرارة

النوعية للماء 4200 J/Kg.K ، فإن الزمن اللازم لرفع درجة حرارة هذه الكمية من الماء من 25°C إلى 85°C

يساوي (أسئلة امتحانات المافظات)

6 دقائق (د)

3 دقائق (ج)

1 دقيقة (ب)


0.5 دقيقة (پ)



01026675233

25

إعداد: أ / أحمد شاهين





Sheet

علوم - متكاملة - نرم - أول

(كتاب الامتحانات)

٣١) الحرارة الكامنة للتصعيد هي الطاقة الحرارية التي تمتصها وحدة الكتلة من المادة

- Ⓐ لترفع درجة حرارتها بمقدار واحد كلفن .
- Ⓑ لتخفض درجة حرارتها بمقدار واحد كلفن .
- Ⓒ أثناء تحولها من سائل الى غاز دون تغير درجة الحرارة .
- Ⓓ أثناء تحولها من صلب الى سائل دون تغير درجة الحرارة .

٣٢) اذا كانت الطاقة الحرارية التي تمتصها كمية معينة من الماء لتتحول من الحالة السائلة عند 100°C الى الحالة الغازية عند نفس درجة الحرارة تساوي (E) ، فإن نفس الكمية من الماء لتتحول من الحالة الغازية عند 100°C الى الحالة السائلة عند نفس درجة الحرارة يجب أن

(كتاب الامتحانات)

- Ⓐ تمتص طاقة حرارية قدرها (E) .
- Ⓑ تمتص طاقة حرارية قدرها (E) .
- Ⓒ تنطلق منها طاقة حرارية قدرها (E) .
- Ⓓ تنطلق منها طاقة حرارية قدرها أقل من (E) .

٣٣) كمية من الماء كتلتها 10 Kg احتاجت طاقة حرارية (E) لتتحول من ماء سائل عند 100°C الى بخار عند نفس درجة الحرارة ، فإن الحرارة الكامنة للتصعيد للماء تساوي

(كتاب الامتحانات)

- Ⓐ E
- Ⓑ $10 E$
- Ⓒ $\frac{E}{10}$
- Ⓓ $\frac{E}{100}$

٣٤) اذا كانت الحرارة الكامنة لتصعيد الماء 2255 KJ/Kg ، فإن الطاقة الحرارية اللازمة لتحويل 5 Kg من الماء من الحالة السائلة الى الحالة الغازية عند نفس درجة الحرارة تساوي

(كتاب الامتحانات)

- Ⓐ 451 KJ
- Ⓑ 2255 KJ
- Ⓒ 11275 KJ
- Ⓓ 22550 KJ

٣٥) الحرارة الكامنة لتصعيد الماء

(كتاب الامتحانات)

- Ⓐ مرتفعة ، لقوة الروابط التساهمية بين ذرتي الأكسجين والهيدروجين .
- Ⓑ مرتفعة ، لقوة الروابط الهيدروجينية بين جزيئات الماء .
- Ⓒ منخفضة ، لضعف الروابط التساهمية بين ذرتي الأكسجين والهيدروجين .
- Ⓓ منخفضة ، لضعف الروابط الهيدروجينية بين جزيئات الماء .

٣٦) يشير مصطلح "الحرارة الكامنة" الى

(أسئلة الوزارة)


- Ⓐ يتم امتصاص الحرارة فقط عندما تكون المادة غير نقية .
- Ⓑ تكون الحرارة مخفية لأنها تسبب تغيراً كبيراً في الضغط .
- Ⓒ يتم امتصاص الحرارة أو إطلاقها دون تغير في درجة الحرارة ($\Delta T = 0$) .
- Ⓓ لا يمكن قياس الحرارة الا باستخدام طريقة غير مباشرة .

٣٧) وحدة قياس الحرارة الكامنة للتصعيد هي

(أسئلة الوزارة)

- Ⓐ J
- Ⓑ J/Kg
- Ⓒ J/K
- Ⓓ J/Kg.K





Sheet

علوم - متكاملة - نرم - أول

(٣٨) أيهما يسبب ضرراً أشد للجسد ، التعرض لبخار ماء عند 100°C أم التعرض لاء سائل عند نفس الدرجة ؟

(كتاب الامتحانات)

علماً بأن : الجسد تعرض لنفس الكمية من الماء وبخار الماء ولنفس الفترة الزمنية)

- Ⓐ الماء السائل ، لكبر حرارته النوعية .
- Ⓑ الماء السائل ، لكبر كمية الحرارة التي يطلقها عند الغليان .
- Ⓒ بخار الماء ، لانخفاض حرارته النوعية .
- Ⓓ بخار الماء ، لكبر كمية الحرارة التي يطلقها عند التكثف .

(٣٩) هناك جسمان متلامسان : وتنتقل الطاقة الحرارية من الجسم (A) الى الجسم (B) ،

(أسئلة الوزارة)

أي مما يأتي يفسر هذه الحالة ؟

- Ⓐ الجسم (A) له حرارة نوعية أعلى من الجسم (B) .
- Ⓑ الفرق بين كتلتيهما هو سبب انتقال الطاقة .
- Ⓒ الجسم (A) يحتوي على طاقة داخلية كلية أقل من الجسم (B) .
- Ⓓ الجسم (A) له درجة حرارة أعلى من الجسم (B) .

(٤٠) يمثل الشكل التالي : التغير الذي حدث لثلاث مواد لها كتل متساوية ودرجات حرارة أولية متساوية تم تسخينها لفترة

زمنية متساوية بواسطة مصدر حراري واحد ، فإن الترتيب الصحيح وفقاً للحرارة النوعية لكل منها هو : (أسئلة الوزارة)



- Ⓐ $B < C < A$
- Ⓑ $A < C < B$
- Ⓒ $C < B < A$
- Ⓓ $A < B < C$

(أسئلة الوزارة)

(٤١) أي مجموعة من الكائنات الحية التالية هي كائنات متغيرة الحرارة (كائنات ذات دم بارد) ؟

- Ⓐ الطيور والتدرييات .
- Ⓑ السمك والبرمائيات والزواحف .
- Ⓒ البسر والحيتان .
- Ⓓ الفصليات فقط .

(٤٢) عند أساب نفس كمية الحرارة لأربع عينات متساوية الكتلة ولكن من مواد مختلفة ، لوحظ التالي :

- * ارتفاع درجة حرارة عينة المادة (W) بمقدار 20°C
- * ارتفاع درجة حرارة عينة المادة (X) بمقدار 40°C
- * ارتفاع درجة حرارة عينة المادة (Y) بمقدار 60°C
- * ارتفاع درجة حرارة عينة المادة (Z) بمقدار 80°C

(أسئلة الوزارة)

أي المواد لها أكبر حرارة نوعية ؟

- Ⓐ المادة W
- Ⓑ المادة X
- Ⓒ المادة Y
- Ⓓ المادة Z





Sheet

علوم - متكاملة - نرم - أول

٤٣) يتم تسخين كتلتين متكافئتين من معدنين مختلفين (A) و (B) من نفس المصدر لنفس المدة الزمنية ، وارتفعت درجة حرارة المعدن (A) بمقدار 50°C وارتفعت درجة حرارة المعدن (B) بمقدار 150°C ، فإذا علمت أن الحرارة النوعية للمعدن (A) تساوي $390 \text{ J/Kg}^{\circ}\text{C}$ ،

(أسئلة الوزارة)

فإن الحرارة النوعية للمعدن (B) تساوي $\text{J/Kg}^{\circ}\text{C}$

520 د

390 ج

260 ب

130 ا

(أسئلة الوزارة)

٤٤) ماذا نعني بقولنا "الحرارة الكامنة للتبخير" ؟

(كتاب الامتحانات)

٤٥) ما العوامل التي تتوقف عليها كمية الحرارة المفقودة أو المكتسبة من جسم لتغيير درجة حرارته ؟

٤٦) أصبب درجة الحرارة النهائية للمخلوط الناتج من خلط 100 Kg من الماء بدرجة حرارة 50°C مع 250 Kg من الماء بدرجة حرارة 50°C ؟

(أسئلة الوزارة)

٤٧) اكتسب جسم من النحاس كتلته 0.3 Kg ودرجة حرارته 20°C كمية من الحرارة مقدارها 5850 J

(أسئلة امتحانات العاقلات)

أصبب درجة حرارة الجسم النهائية ؟ (علماً بأن : الحرارة النوعية للنحاس 390 J/Kg.K)



01026675233

28

إعداد : أ / أحمد شاهين





Sheet

علوم - متكاملة - ترم - أول

(٤٨) قطعة من الألومنيوم درجة حرارتها 30°C عند السابحها كمية من الحرارة قدرها 500 Joule ، ارتفعت درجة حرارتها إلى 310 K ، أصب كتلة قطعة الألومنيوم ؟ (علماً بأن : الحرارة النوعية للألومنيوم 900 J/Kg.K)

(أسئلة امتحانات المافظات)

(٤٩) أضيف 50 Kg من ماء ساخن درجة حرارته 90°C إلى 20 Kg من ماء بارد درجة حرارته 20°C

(أسئلة امتحانات المافظات)


أوجد درجة الحرارة النهائية للماء ؟




01026675233

29

إعداد : أ / أحمد شاهين





Sheet

علوم - متكاملة - نرم - أول

الدرس الرابع / المحاليل المائية وخواصها

(أسئلة امتحانات المانظرات)

١) أي مما يلي له أعلى ضغط اسموزي ؟


أ) محلول منخفض التركيز .

ب) محلول عالي التركيز .

ج) سائل نقي درجة حرارته مرتفعة .

د) سائل نقي درجة حرارته منخفضة .

٢) أي الأشكال البيانية التالية يوضح العلاقة بين تركيز السكر في محلول سكري والضغط الاسموزي له ؟



(كتاب الامتحانات)

٣) الضغط الاسموزي يؤدي لانتقال الماء من المحلول الذي يتميز ب

أ) ارتفاع ضغطه الاسموزي . ب) زيادة تركيز الأملاح . ج) انخفاض ضغطه الاسموزي . د) قلة هزيئات الماء .

٤) النسبة بين الضغط الاسموزي للمياه العذبة الى الضغط الاسموزي

(كتاب الأضواء)

للمحاليل بأقسام الكائنات الحية التي تعيش بها

أ) أكبر من الراصد . ب) أقل من الراصد . ج) تساوي الراصد . د) يساوي صفر .



(كتاب الأضواء)

٥) الشكل المقابل : يوضح إحدى طرق طهي الطعام على قمة جبل ،

ماذا نتوقع لدرجة الحرارة اللازمة لغلbian الماء ؟

أ) ترتفع درجة غلbian الماء . ب) تنخفض درجة غلbian الماء . ج) الماء لا يغلي على قمة الجبال . د) درجة الغلbian العادية مساوية لسطح الأرض .


(كتاب الأضواء)

٦) الضغط البخاري للمياه البحر

أ) أقل من ب) أكبر من ج) يساوي د) لا توجد إجابة صحيحة

(كتاب الأضواء)

٧) أي من الأشكال التالية يعبر عن العلاقة بين الضغط الجوي (X) ودرجة الغلbian (Y) ؟



01026675233

30

إعداد : أ / أحمد شاهين





Sheet

علوم - متكاملة - نرم - أول

٨) أحد متسلقى الجبال استخدم النار لغللي الماء قبل الصعود لقمة الجبل ،

(كتاب المضراء)

فاحتاج الى درجة حرارة درجة الحرارة التي سوف يحتاجها على قمة الجبل .

- ٩) أكبر من (ب) أقل من (ج) سادية (د) لا يمكن تحديد اجابة



(كتاب الامتحانات)

٩) في السكّل البياني المقابل :

أي مما يلي يمثل ترتيب العالييل حسب ضغطها الاسموزي ؟

٩) $W > X > Y > Z$

١٠) $X > Z > Y > W$


١١) $W > Y > Z > X$

١٢) $Z > Y > X > W$

١٠) أي مما يلي من الخواص الجمعية للمحاليل ؟

(أسئلة امتحانات العانظات)

٩) ارتفاع الضغط البخاري . (ب) انخفاض درجة الغليان . (ج) ارتفاع درجة التجمد . (د) الضغط الاسموزي .



١١) في السكّلين المقابلين : تم ادخال حجمين متساويين من

السائلين (X) ، (Y) في أنبوبي الجهاز الرضع بالسكّل (1) ،

فانخفض مستوى الزئبق في الأنبوبين كما بالسكّل (2) ،

أي مما يلي قد يعد صحيحاً ؟ (كتاب الامتحانات)

٩) X يمثل ماء مقطر ، Y يمثل محلول NaCl

١٠) X يمثل ماء نهر ، Y يمثل ماء بحر .

١١) X يمثل محلول NaCl ، Y يمثل ماء مقطر .

١٢) X يمثل ماء مقطر ، Y يمثل ماء محيط .


١٣) تحت الضغط الجوى العتاد ، اذا كانت درجة غليان مذيّب نقى $X^{\circ}C$

(أسئلة امتحانات العانظات)

فإن درجة غليان المحلول الناتج عن ذوبان أحد الأملاح فيه

- ٩) تساوى $X^{\circ}C$ (ب) أعلى من $X^{\circ}C$ (ج) أقل من $X^{\circ}C$ (د) تساوى $\frac{1}{2} X^{\circ}C$

١٣) أي الاسكّال البيانية الآتية توضع العلاقة بين درجة الغليان (T) للماء النقى والارتفاع عن سطح البحر ؟



01026675233

31

إعداد : أ / أحمد شاهين





Sheet

علوم - متكاملة - نرم - أول

١٤) إذا كانت درجة التجمد لنقي 0°C

(أسئلة امتحانات العاقلات)

فكم ستكون درجة التجمد إذا أذيب فيه كمية من اللع مقدارها 5 g ؟

- أ) أقل من 0°C ب) أكبر من 0°C ج) تساوي 0°C د) $0^{\circ}\text{C} : 4^{\circ}\text{C}$

(كتاب الامتعات)

١٥) كلما زاد الضغط الاسموزى للمحلل ، فإن الضغط البخاري له

- أ) يندرم . ب) يزيء . ج) يقل . د) لا يتأثر .

(أسئلة امتحانات العاقلات)

١٦) أى مما يلى يعبر عن الماء فى جميع السطحات المائية على سطح الأرض ؟

- أ) يوجد فى صورة نقية . ب) به مراد ذائبة أو عالقة .
ج) له نفس درجة الحرارة . د) له نفس درجة اللوحة .

(كتاب الامتعات)

١٧) تعتمد الخواص الجمعية للمحاليل المائية على

- أ) طبيعة مادة الذيب . ب) طبيعة مادة الذاب . ج) حجم المحلل . د) عدد جزيئات الذاب .

(أسئلة الوزارة)

١٨) يبدأ السائل فى الغليان عندما يكون ضغطه البخاري

- أ) أقل من الضغط الواقع عليه . ب) أكبر من الضغط الواقع عليه .
ج) مساوياً للضغط الواقع عليه . د) ضعف الضغط الواقع عليه .

(أسئلة الوزارة)

١٩) متى يصل السائل إلى حالة الأثران الديناميكى ؟

- أ) عندما يكون معدل التبخر أكبر من معدل التكثف .
ب) عندما يتساوى معدل التبخر مع معدل التكثف .
ج) عندما يكون معدل التبخر أقل من معدل التكثف .
د) عندما يستمر التبخر ويندزم التكثف .

(أسئلة الوزارة)

٢٠) ما سبب انخفاض درجة تجمد محلول مائى مقارنة بدرجة تجمد الماء النقي ؟

- أ) قوى التجاذب بين جزيئات الذاب وجزيئات الماء تعوق التجمد .
ب) الماء النقي يحتوى على عدد أكبر من الجزيئات الذائبة .
ج) الأملاح الذائبة فى المحلل تقلل من ضغطه الاسموزي .
د) انخفاض الضغط البخاري للماء النقي .

(أسئلة امتحانات العاقلات)

٢١) ماذا يحدث للضغط البخاري للمحلل المائى مع زيادة تركيز المادة الذائبة ؟

- أ) ينخفض . ب) يرتفع . ج) لا يتأثر . د) يندرم .

(أسئلة امتحانات العاقلات)

٢٢) ماذا يحدث لضغط بخار السائل مع ارتفاع درجة حرارة السائل فى نظام مغلق ؟

- أ) يزداد . ب) يقل . ج) لا يتأثر . د) يندرم .





Sheet

علوم - متكاملة - نرم - أول

(كتاب الامتحانات)

٢٣) أي العوامل الآتية لا يؤثر على درجة غليان المحلول ؟

- ١) الضغط الجوي . ٢) تركيز المحلول . ٣) حجم المحلول . ٤) عدد أيونات الذائب .

٢٤) ما أثر الزيادة في عدد جزيئات الذائب في المحلول على درجة غليان المحلول وضغطه الأسمرزي على الترتيب ؟

- ١) تزايد ، تزايد ٢) تقل ، تقل ٣) تزايد ، تقل ٤) تقل ، تزايد

٢٥) ما تأثير زيادة عدد جزيئات الذائب في حجم من الماء النقي على كل من درجتي تجمده وغليانه على الترتيب ؟

- ١) ترتفع ، ترتفع ٢) ترتفع ، تنخفض ٣) تنخفض ، تنخفض ٤) تنخفض ، ترتفع

(كتاب الامتحانات)

٢٦) أي محاليل سكر المائدة الآتية درجة غليانه هي الأكبر ؟

- ١) محلول تركيزه 10 g/L ٢) محلول تركيزه 5 g/L
٣) محلول تركيزه 9 g/L ٤) محلول تركيزه 1 g/L

٢٧) إذا كانت درجة غليان محلول ما على قمة جبل مرتفع 108°C

(أسئلة امتحانات العانظات)

فإن درجة غليان نفس المحلول على سطح الأرض يمكن أن تكون

- ١) 106°C ٢) 104°C ٣) 108°C ٤) 110°C

٢٨) إذا كانت درجة غليان محض الأسيتك تحت ضغط (1 atm) تساوي 118°C

(كتاب الامتحانات)

فمن التوقع أن درجة غليانه تحت ضغط (0.8 atm) تساوي

- ١) 111°C ٢) 118°C ٣) 119°C ٤) 125°C

٢٩) بفرض أن سائل ما يغلي عند درجة حرارة 90°C

(كتاب الامتحانات)

فعند تعرضه لضغط عالي ، فإن درجة الغليان له يمكن أن تكون

- ١) 82°C ٢) 90°C ٣) 110°C ٤) 70°C

(أسئلة امتحانات العانظات)

٣٠) يتميز المحلول عن الذيب النقي ب

- ١) انخفاض الضغط البخاري . ٢) انخفاض درجة الغليان . ٣) ارتفاع درجة التجمد . ٤) انعدام الضغط الأسمرزي .

(كتاب الامتحانات)

٣١) أي مما يلي تؤدي زيادته إلى خفض الضغط البخاري للمحاليل ؟

- ١) عدد جزيئات الذيب . ٢) عدد جزيئات الذائب . ٣) درجة الحرارة . ٤) كمية المحلول .

(كتاب الامتحانات)

٣٢) المحاليل التالية متساوية التركيز ، أي منها يكون له أقل ضغط بخاري ؟

- ١) NaCl ٢) CuCl_2 ٣) $\text{Al}(\text{NO}_3)_3$ ٤) HCl

(كتاب الاضراء)

٣٣) المحاليل التالية متساوية التركيز ، أي منها يكون له أعلى درجة تجمد ؟

- ١) NaCl ٢) CaCl_2 ٣) $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ ٤) AlCl_3





Sheet

(كتاب الامتحانات)

(٣٤) في أي من الحالات الآتية تقل درجة غليان الماء النقي ؟

- (أ) داخل حلة الضغط .
(ب) عند إضافة ملح الطعام إليه .
(ج) فوق قمة جبل .
(د) عند زيادة الضغط الجوي .

(أسئلة الوزارة)


(٣٥) بالارتفاع لأعلى عن مستوى سطح البحر ، أي مما يلي صحيح لدرجة غليان الماء النقي ؟

- (أ) تقل لارتفاع الضغط الجوي .
(ب) تقل لانخفاض الضغط الجوي .
(ج) تزداد لانخفاض الضغط الجوي .
(د) تزداد لارتفاع الضغط الجوي .

(أسئلة الوزارة)

(٣٦) تقل احتمالية تبخر هزيئات الماء في العاليل مقارنة بالماء النقي بسبب

- (أ) زيادة قوى التجاذب بين هزيئات الماء .
(ب) نقص قوى التجاذب بين هزيئات الماء .
(ج) وجود قوى التجاذب بين هزيئات الماء والذائب .
(د) غياب قوى التجاذب بين هزيئات الماء والذائب .



(٣٧) الشكل البياني المقابل : يعبر عن العلاقة بين الضغط

البخاري لأربعة سوائل نقية (X) ، (Y) ، (Z) ، (W) عند درجات حرارة مختلفة ، أي السوائل درجة غليانه هي الأكبر تحت الضغط الجوي العتاد ؟ (كتاب الامتحانات)

- (أ) (X)
(ب) (Y)
(ج) (Z)
(د) (W)

(٣٨) محلولين (X) ، (Y) لنفس الملح ، إذا كانت درجة غليان المحلول (X) أعلى من درجة غليان المحلول (Y) ، فإن

(كتاب الامتحانات)

- (أ) تركيز الملح في المحلول (X) أكبر .
(ب) الضغط عند سطح المحلول (X) أقل .
(ج) تركيز الملح في المحلول (Y) أكبر .
(د) الضغط عند سطح المحلول (Y) أعلى .

(٣٩) عند المقارنة بين تركيزين متساويين من محلولي $Al(NO_3)_3$ و $Al_2(SO_4)_3$ ، فإن درجة الغليان والضغط البخاري في محلول كبريتات الألمنيوم بالنسبة لمحلول نترات الألمنيوم تكون

(أسئلة امتحانات العانظات)

تكون

- (أ) أقل ، أكبر
(ب) أكبر ، أقل
(ج) أكبر ، أكبر
(د) أقل ، أقل

(٤٠) درجة تجدد تركيز معين من محلول كلوريد المغنسيوم ($MgCl_2$) درجة تجدد نفس التركيز من محلول نترات البروتاسيوم (KNO_3) .

(أسئلة امتحانات العانظات)

- (أ) أكبر من
(ب) أقل من
(ج) يساوي
(د) لا توجد إجابة صحيحة





Sheet

علوم - متكاملة - نرم - أول

(٤١) زيادة عدد أيونات المواد غير المتطايرة الذائبة في الماء ، كل ما يلي يعد صحيحاً ، ما عدا (كتاب الامتحانات)
 (أ) يقل الضغط البخاري . (ب) تزداد درجة الغليان . (ج) تقل درجة التجمد . (د) يقل الضغط الأسموزي .

(٤٢) عند إضافة 50 mL من الماء النقي إلى 100 mL من محلول ملحي ،

فإن المحلول (أسئلة امتحانات المافظات)

(أ) تقل درجة غليانه ويقل ضغطه البخاري . (ب) تقل درجة تجمده وتزداد درجة غليانه .
 (ج) يزداد ضغطه البخاري ويزداد ضغطه الأسموزي . (د) تزداد درجة تجمده ويزداد ضغطه البخاري .


المركب	درجة الغليان (°C) تحت الضغط الجوي المعتاد
الماء	100
الأسيتون	56
الأسيتالدهيد	31
حمض الأسيتيك	118

(أسئلة امتحانات المافظات)

(٤٣) من الجدول المقابل :

ما السائل الذي يكون ضغطه البخاري هو الأكبر في درجة حرارة الغرفة عند (25°C) ؟

(أ) الماء . (ب) الأسيتون .
 (ج) الأسيتالدهيد . (د) حمض الأسيتيك .



(٤٤) من خلال دراستك للسلك المقابل :

أي مما يلي يمثل التغير الناتج عند إضافة 25 g من كلوريد الصوديوم إلى 25 mL من الماء النقي خلال فترة من الزمن ؟ (كتاب الامتحانات)

(أ) (W) (ب) (X)
 (ج) (Y) (د) (Z)

(٤٥) أي مما يلي يمثل ترتيباً صحيحاً بالنسبة للضغط الأسموزي لثلاث عينات مياه من مصادر مختلفة عند درجة حرارة تساوي 25°C ؟ (كتاب الامتحانات)


(أ) ماء عذب < ماء مقطر < ماء ملح . (ب) ماء عذب = ماء مقطر < ماء ملح .
 (ج) ماء ملح < ماء عذب < ماء مقطر . (د) ماء ملح < ماء عذب = ماء مقطر .

(٤٦) إذا كانت الضغط البخاري لسائل ما يساوي (X) عند درجة حرارة معينة

(أسئلة امتحانات المافظات)

والضغط الجوي الواقع عليه يساوي (1.5 X) ، فإن السائل

(أ) يغلي . (ب) يزداد حجمه . (ج) يتجمد . (د) لا يصل لدرجة الغليان .



(٤٧) من السلك المقابل : أي مما يلي يصف العينتين (X) ، (Y) عند الضغط الجوي المعتاد ؟ (كتاب الامتحانات)

(أ) كلاهما محلول ملحي مائي . (ب) كلاهما ماء نقي .
 (ج) ماء نقي ، ومحلول ملحي مائي على الترتيب . (د) محلول ملحي مائي ، وماء نقي على الترتيب .



01026675233

35

إعداد : أ / أحمد شاهين





Sheet

علوم - متكاملة - نرم - أول

٤٨) عند إذابة 5 g من الملح (X) في 100 mL من الماء القطر ،

أي الاختبارات التالية يعبر عن التغير الحادث في الخواص الآتية ؟

(أسئلة امتحانات العاقلات)

الضغط الأسموزي	الضغط البخاري	درجة التجمد	درجة الغليان	
يزداد	يقل	تقل	تزداد	أ
يقل	يزداد	تقل	تزداد	ب
يقل	يزداد	تزداد	تقل	ج
يزداد	يقل	تزداد	تقل	د

٤٩) في أي الحالات التالية يعل الماء النقي بسرعة قبل وصول درجة حرارته إلى 100°C ؟

(كتاب الامتحان)

- أ) التواجد عند قمة جبل .
 ب) التواجد في وادي منخفض .
 ج) التواجد عند مستوى سطح البحر .
 د) وضع الماء في حلة ضغط .


٥٠) ما الذي يعبر عن مصطلح تركيز المحلول ؟

(كتاب الامتحان)

- أ) حجم المحلول الكلي .
 ب) نوع المذاب والمذيب .
 ج) كمية المذاب في حجم معين من المذيب .
 د) درجة حرارة المحلول .

٥١) أي من الأشكال التالية يمثل العلاقة بين الضغط البخاري للمحلول وكمية المذابة ؟

(كتاب الامتحان)



٥٢) كل ما يلي من تأثيرات إضافة مذاب إلى الماء النقي ، ما عدا

(كتاب الامتحان)

- أ) زيادة الكثافة .
 ب) انخفاض الضغط البخاري .
 ج) ارتفاع درجة الغليان .
 د) انخفاض درجة التجمد .

٥٣) إذا كانت درجة غليان سائل نقي هي X°C وتم إضافة كمية من ملح الطعام لهذا السائل

(أسئلة امتحانات العاقلات)

فأصبحت درجة غليانه 25°C ، فإن النسبة بين $\frac{X}{25}$

- أ) تساوي صفر .
 ب) أقل من الواحد .
 ج) أكبر من الواحد .
 د) تساوي الواحد .

٥٤) عند إضافة كمية من الماء القطر إلى محلول ملحي ، فإن درجة غليانه

(كتاب الامتحان)

- أ) ترتفع .
 ب) تنخفض .
 ج) تبقى كما هي .
 د) تتغير بشكل عشوائي .





Sheet

علوم - متكاملة - نرم - أول

(أسئلة امتحانات المناظرات)

٥٥) المحلول المائي الذي يحتوي على أكبر عدد من جزيئات المذاب هو

المحلول	Z	Y	X	W
درجة الغليان	102°C	104°C	108°C	100°C

د

ج


ب

أ


٥٦) أي الأشكال التالية يمثل العلاقة الصحيحة بين قمة الضغط الجوي (X)

والطاقة اللازمة لتسريع جزيئات الماء عند تبخيره (Y) ؟


(كتاب الضراء)




د



ج




ب



أ

٥٧) يوضع الرسم البياني المقابل : كتلة مختلفة لمادة كلوريد البوتاسيوم (KCl) مذابة في

كميات متساوية من الماء ، أي المحاليل التالية هو الأعلى في درجة التجمد ؟ (كتاب الضراء)



ب (B)

أ (A)

د (D)

ج (C)

(كتاب الضراء)

٥٨) تترك كميات من الملح على الطرف في المناطق الباردة حتى تصبغ

أ) درجة تجمد المحلول = درجة تجمد الماء .

ب) درجة غليان المحلول أكبر من درجة غليان الماء .

ج) درجة تجمد المحلول أكبر من درجة تجمد الماء .

د) درجة تجمد المحلول أقل من درجة تجمد الماء .

(أسئلة الزارة)

٥٩) يتم رش الملح على الطرف في المناطق المتجمدة بعد سقوط الجليد

أ) لخفض درجة انصهار الجليد .

ب) لرفع درجة انصهار الجليد .

ج) لتقليل كمية البخر .


د) لتقليل الضغط البخاري الناتج عن الماء .

(كتاب الضراء)

٦٠) ما العلاقة النسبية التي تعبر عن الانخفاض في الضغط البخاري مع عدد أيونات المذاب ؟



د



ج



ب



أ





Sheet

علوم - متكاملة - نرم - أول

٦١) أي من المحاليل التالية يؤدي إلى انخفاض أكبر في درجة التجمد ؟

- (أ) كلوريد الصوديوم (NaCl).
 (ب) كلوريد الكالسيوم (CaCl₂).
 (ج) كبريتات المغنسيوم (MgSO₄).
 (د) الماء النقي.

٦٢) سائلان X, Y يفصل بينهما غشاء شبه منفذ وكان درجة غليان (X) < درجة غليان (Y)

فإن الماء

- (أ) ينتقل من السائل (X) إلى السائل (Y).
 (ب) يظل ثابت في السائلين دون أن يتحرك.
 (ج) ينتقل من السائل (Y) إلى السائل (X).
 (د) يتحرك من السائلين بنفس المعدل.

٦٣) كلما زادت درجة تجمد محلول ، فإن الضغط الأسموزي له

- (أ) يزداد .
 (ب) يقل .
 (ج) لا يتغير .
 (د) ينعدم .

٦٤) عند إذابة كمية من ملح الطعام في ماء مقطر ، فإن الضغط الأسموزي للسائل

- (أ) يزداد .
 (ب) يقل .
 (ج) لا يتغير .
 (د) ينعدم .

٦٥) تركت عينة من محلول مائي معرضة للهواء الجوي فتبخر جزء من الماء ،

فإن درجة الغليان

- (أ) يزداد .
 (ب) يقل .
 (ج) لا يتغير .
 (د) ينعدم .

٦٦) أي مما يأتي تؤدي نقصها إلى زيادة الضغط البخاري للمحاليل ؟

- (أ) عدد جزيئات المذاب .
 (ب) عدد جزيئات المذاب .
 (ج) درجة الحرارة .
 (د) درجة الغليان .

٦٧) إذا كانت درجة غليان الماء عند أسفل جبل = 100°C ، فإن درجة غليان الماء عند قمة الجبل تكون

- (أ) 95°C
 (ب) 120°C
 (ج) 373 K
 (د) 0 K

٦٨) يتناسب الانخفاض في درجة التجمد تناسباً

وتتناسب ارتفاع درجة الغليان تناسباً

- (أ) طردياً / طردياً
 (ب) عكسياً / طردياً
 (ج) عكسياً / عكسياً
 (د) طردياً / عكسياً

٦٩) في الجدول التالي : ثلاثة محاليل مائية متساوية الحجم X, Y, Z

مذاب بأكبر منها ملح كلوريد الصوديوم بكميات مختلفة ، ادرسه جيداً ، ثم أجب :

المحلول	X	Y	Z
كمية ملح الطعام المذاب	50 g	10 g	80 g

فإن الترتيب الصحيح تبعاً لدرجة تجمد كل منهم هي

- (أ) Tz < Ty < Tx
 (ب) Tz = Ty = Tx

- (ج) Tz < Tx < Ty
 (د) Tz > Tx > Ty



01026675233

38

إعداد : أ / أحمد شاهين





(أسئلة الوزارة)

Sheet

علوم - متكاملة - نرم - أول

٧٠) تعتمد الخواص الجمعية للمحلول علي

- ١) نوع المادة الذائبة فقط .
٢) نوع المادة الذائبة وتركيزها .
٣) تركيز المادة الذائبة وليس على نوعها .
٤) نوع المادة الذائبة فقط .

(أسئلة امتحانات العانظات)

٧١) ما المقصود بالاسموزية ؟

(أسئلة الوزارة)

٧٢) ما المقصود بالضغط البخاري ؟

٧٣) علل / درجة غليان المحلول المائي أعلى من درجة غليان الماء النقي عند الضغط الجوي العتاد ؟ (أسئلة الوزارة)

(أسئلة امتحانات العانظات)

٧٤) علل / سرعة تطاير الماء النقي أكبر من العاليل المائية ؟

(أسئلة الوزارة)

٧٥) ماذا يحدث عند تساوي معدل التبخر مع معدل التكثف ؟

٧٦) قارن بين درجة غليان الماء النقي عند قياسها فوق قمة جبل وداخل حلة الضغط ، مع التفسير ؟ (أسئلة امتحانات العانظات)

(كتاب الامتحنات)

٧٧) اذا كان لدينا سائلين (س) ، (ص) : يتبخر (س) بسرعة أكبر من (ص) عند 30°C :

١) أي السائلين له ضغط بخاري أعلى عند 30°C ؟

٢) أي السائلين له درجة غليان أكبر ؟




01026675233

39

إعداد : أ / أحمد شاهين





Sheet

علوم - متكاملة - نرم - أول

الدرس الخامس / أهمية البيولوجية للماء

١) أي مما يأتي يتركب من السليلوز؟

(كتاب الامتحانات)

- ١) الغشاء الخلوي . ٢) الجدار الخلوي . ٣) الغشاء النووي . ٤) البلاستيدة الخضراء .

٢) بعد إزالة الغشاء النووي من خلية حقيقية النواة ، فإن الخلية بعد التعديل تشبه خلية (أسئلة الوزارة)

- ١) البكتريا . ٢) الطلائعيات . ٣) الفطريات . ٤) الطحالب .

٣) بفحص خلية تحت الميكروسكوب لوحظ وجود مادة الليتين في جدارها ،

مما يؤكد أنها خلية لـ

(كتاب الاضراء)

- ١) نبات الصنوبر . ٢) طحلب ذهبي . ٣) فطر الخميرة . ٤) جلد انسان .

٤) أي اللائنات الحية التالية تحتوي جدارها الخلوي على مادة البيندوجليكان ؟

(كتاب الامتحانات)

- ١) العار . ٢) البكتريا . ٣) الخميرة . ٤) نبات الفول .

٥) تصل النسبة بين كمية الماء خارج الخلايا الى كميته داخل خلايا جسم أحد الثدييات ،

الى حوالي

(كتاب الاضراء)

- ١) 2 : 1 ٢) 1 : 2 ٣) 1 : 3 ٤) 4 : 1

٦) أي اللائنات التالية لا تنطبق على البكتريا ؟

(كتاب الامتحانات)

- ١) لائنات بدائية النواة . ٢) لائنات مادتها الوراثية محاطة بغشاء نووي . ٣) تحتوي جدارها الخلوي على مادة البيندوجليكان . ٤) لائنات وهيدة الخلية .

٧) تعتبر الأوليات الحيوانية من اللائنات

(كتاب الاضراء)

- ١) عديدة الخلايا ذاتية التغذية . ٢) عديدة الخلايا معقدة التركيب غير ذاتية التغذية . ٣) وهيدة الخلية ذاتية التغذية . ٤) وهيدة الخلية غير ذاتية التغذية .

٨) أي الممالك التالية غالباً ما تكون لائنات مائية ؟

(كتاب الامتحانات)

- ١) الطلائعيات . ٢) الفطريات . ٣) النبات . ٤) الحيوان .

٩) اذا وجد كائن حي مادته الوراثية حرة في السيتوبلازم ولايحتوي على ميتوكوندريا ،

فإن هذا الكائن

(أسئلة الوزارة)

- ١) بدائي النواة . ٢) حقيقي النواة . ٣) نبات . ٤) حيوان .

١٠) تشترك الفطريات مع الأوليات الحيوانية في أن جميعها

(كتاب الامتحانات)

- ١) تحتوي على جدار خلوي . ٢) غير ذاتية التغذية . ٣) لائنات مائية . ٤) وهيدة الخلية .





Sheet

علوم - متكاملة - نرم - أول

(كتاب الامتحانات)

١١) تتشابه جميع حقيقيات النواة في اختواها على

- ٢) فجوة كبيرة . ٣) ميتوكوندريا . ٤) جدار خلوي . ٥) بلاستيدات خضراء .

(كتاب الاضواء)

١٢) أي مما يلي لا يمكن أن يتكون منه جدارت الخلايا في الكائنات الحية ؟

- ٢) سليلوز . ٣) كيتين . ٤) الدهون . ٥) بيتيدوجليكات .

(كتاب الامتحانات)

١٣) أي مما يلي يميز مملكة الحبران ؟

- ٢) جميع كائناتها وصيدة الخلية . ٣) معظم كائناتها قادرة على الحركة . ٤) معظم كائناتها بدائية النواة . ٥) جميع كائناتها ذاتية التغذية .

(كتاب الامتحانات)

١٤) أي مما يلي يشترك وجوده في الخلايا النباتية والفطريات والبكتريا ؟

- ٢) الجدار الخلوي والغشاء البلازمي . ٣) الميتوكوندريا والبلاستيدات الخضراء . ٤) الفجوات العصارية والبلاستيدات الخضراء . ٥) الجدار الخلوي والفجوات العصارية .

(كتاب الاضواء)

١٥) أي مما يلي لا يمكن أن يوجد في خلايا الفقاريات ؟

- ٢) النواة . ٣) الفجوة . ٤) الغشاء البلازمي . ٥) الجدار الخلوي .

(كتاب الامتحانات)

١٦) أي مما يلي يشترك وجوده في خلية من جلد الإنسان وخلية من ورقة نبات الذرة ؟

- ٢) نواة ديتوبلازم . ٣) نواة وبلاستيدة . ٤) غشاء بلازمي وجدار خلوي . ٥) غشاء بلازمي وفجوة كبيرة .

(أسئلة الوزارة)

١٧) تعطل الميتوكوندريا في الخلية يؤدي مباشرة الى

- ٢) توقف تصنيع البروتينات . ٣) فشل انقسام الخلية . ٤) توقف عملية التنفس . ٥) انخفاض إنتاج الطاقة (ATP) .

(كتاب الاضواء)

١٨) يعد وجود الماء في السيتوبلازم ضرورياً للحفاظ على شكل الخلية ، لأنه

- ٢) يعمل كمذيب عام . ٣) انخفاض كثافته . ٤) يكون ضغطاً داخلياً مقاوماً للضغط الخارجي . ٥) ضعف تايته .

(كتاب الامتحانات)

١٩) أي مما يلي يتكون معظمه من الماء ؟

- ٢) الجدار الخلوي . ٣) الميتوكوندريا . ٤) النواة . ٥) السيتوبلازم .

(كتاب الاضواء)

٢٠) عند فحص خلية تحت المجهر يمكننا تصنيفها كخلية نباتية أو حيوانية من مشاهدة

- ٢) عدد الخلايا . ٣) الشبكة الإندوبلازمية . ٤) غشاء للنواة . ٥) الجدار الخلوي .

(كتاب الامتحانات)

٢١) أي التراكيب التالية له وظيفة النقل داخل الخلية الحية ؟

- ٢) الشبكة الإندوبلازمية . ٣) الميتوكوندريا . ٤) الفجوة العصارية . ٥) البلاستيدة الخضراء .





Sheet

علوم - متكاملة - نرم - أول

(كتاب الاضواء)

٢٢ يعمل الجدار الخلوي في النبات علي

- ١ تسريع النقل النشط .
- ٢ تدعيم وتحديد شكل الخلية .
- ٣ صناعة البروتين .
- ٤ تنشيط التنفس الخلوي .

(كتاب الامتحانات)

٢٣ من الجزيئات غير العضوية

- ١ الكربوهيدرات .
- ٢ الماء .
- ٣ البروتينات .
- ٤ الليبيدات .

(كتاب الاضواء)

٢٤ تعتبر النواة مركز التحكم لأنها

- ١ تحتوي على صبغة الكلوروفيل .
- ٢ تخزن قدرأ أكبر من الطاقة .
- ٣ تحتوي على المادة الوراثية .
- ٤ تحتوي على فجوة عصارية .

(كتاب الامتحانات)

٢٥ أي مما يلي يشارك بشكل مباشر في جميع عمليات التمثيل الغذائي ؟

- ١ الأملاح المعدنية .
- ٢ الماء .
- ٣ الليبيدات .
- ٤ الكربوهيدرات .

(كتاب الاضواء)

٢٦ لماذا يعتبر الماء وسطاً مثالياً لنقل العناصر في الدم ؟

- ١ لعدم قطبيته .
- ٢ لقدرته على إذابة العديد من المواد .
- ٣ لارتفاع درجة غليانه .
- ٤ لارتفاع حرارته النوعية .

(كتاب الامتحانات)

٢٧ يتم تكسير سكر الجلوكوز داخل الخلية خلال عملية تسمى

- ١ الإخراج .
- ٢ الهضم .
- ٣ التنفس الخلوي .
- ٤ البناء الضوئي .

(كتاب الامتحانات)

٢٨ أي مما يلي من نواتج تكسير سكر الجلوكوز ؟

- ١ O_2 وطاقة .
- ٢ O_2 وماء .
- ٣ CO_2 و O_2 .
- ٤ ماء و CO_2 .

(كتاب الامتحانات)

٢٩ أي العبارات التالية تعبر عن أحد مميزات عملية الهدم ؟

- ١ تهدف لتخزين الطاقة داخل الخلية لحين استفادتها .
- ٢ تتم في خلايا النبات ولا تتم في خلايا الحيوان .
- ٣ يتم فيها الحصول على الطاقة اللازمة لقيام الخلية بوظائفها الحيوية .
- ٤ تتم في خلايا الحيوان ولا تتم في خلايا النبات .

(كتاب الامتحانات)

٣٠ أي مما يلي ينطبق على عملية البناء وعملية الهدم على الترتيب ؟

- ١ عملية أكسدة ، عملية اختزال .
- ٢ تستهلك طاقة ، تنتج طاقة .
- ٣ تنتج طاقة ، تستهلك طاقة .
- ٤ يتم فيها كسر الروابط الكيميائية ، يتم فيها تكوين روابط كيميائية .






Sheet


علوم - متكاملة - نرم - أول

٣١) من الشكل البياني المقابل : الذي يوضح تأثير الإنزيم على طاقة التنشيط لأحد التفاعلات الكيميائية ، أي مما يلي يمثل السهم الذي يوضح الاختزال في طاقة التنشيط نتيجة إضافة الإنزيم ؟



- أ) س
- ب) ص
- ج) ع
- د) ل

٣٢) من الرسم البياني المقابل : (كتاب الاضراء) أي مما يلي يوضح معدلات الهدم والبناء لطفل عمره 5 شهور ؟




- أ) A
- ب) B
- ج) C
- د) D

٣٣) أي مما يلي يربط بشكل صحيح بين الماء وتفاعلات الأيض ؟ (أسئلة الرزاة)


- أ) الماء مخزن للطاقة مباشرة .
- ب) الماء وسط للتفاعلات الحبرية .
- ج) الماء يوقف نشاط الإنزيمات .
- د) الماء يكون الغشاء البلازمي .

٣٤) الشكل المقابل : يوضح إحدى خواص الإنزيمات ، ما هي ؟ (كتاب الامتحانات)



- أ) تشارك في التفاعل دون أن تستهلك .
- ب) تزيد من سرعة التفاعل .
- ج) تنفصص للاتحاد بمادة معينة .
- د) تقلل طاقة التنشيط .

٣٥) أي الأشكال البيانية التالية يوضح تركيز مادة التفاعل عند إضافة إنزيم إليها ؟ (كتاب الامتحانات)



د

ج

ب

أ

٣٦) أي من العوامل التالية يؤدي إلى إبطاء عمل الإنزيم بشكل مباشر ؟ (كتاب الامتحانات)

- أ) تغيير قيمة pH إلى الحد الأمثل لعمله .
- ب) رفع درجة الحرارة أعلى من الدرجة المثلى لعمله .
- ج) زيادة هزيئات مادة التفاعل .
- د) زيادة هزيئات الإنزيم .



01026675233

43

إعداد : أ / أحمد شاهين





(أسئلة الزمارة)


Sheet

علوم - متكاملة - ترم - أول


٣٧) أى من العوامل التالية يؤدي إلى إبطاء عمل إنزيم بشكل مباشر؟

- أ) زيادة عدد المبتكرين.
- ب) رفع درجة الحرارة أعلى من الحد الأمثل.
- ج) توافر هزيئات مادة التفاعل (الركيزة) بكثرة.
- د) زيادة حجم الفجوة العصارية.

٣٨) أى الأشكال البيانية التالية يمثل تأثير pH على عمل إنزيم الكاتاليز في خلايا نبات البطاطا؟ (كتاب الامتحانات)



٣٩) أى العلاقات التالية يمثل العلاقة بين نشاط الإنزيم (X) وطاقة تنشيط التفاعلات المحيية (Y)؟ (كتاب الامتحانات)



٤٠) أى مما يلي يعتبر السبب في ثبات معدل التفاعل بعد فترة من بداية التفاعل في وجود الإنزيم؟ (كتاب الامتحانات)

- أ) زيادة تركيز الإنزيم.
- ب) تسع المواقع النشطة للإنزيم بمادة التفاعل.
- ج) زيادة تركيز مادة التفاعل.
- د) زيادة عدد المواقع النشطة للإنزيم.

٤١) كل مما يلي من خصائص الإنزيمات ، ما عدا (كتاب الامتحانات)

- أ) يتأثر بدرجة الحرارة ورقم pH.
- ب) يساعد على تحويل التفاعلات إلى نواتج.
- ج) يؤثر على سرعة التفاعل.
- د) يقلل تركيزه بعد التفاعل.


٤٢) الغلط التالي : يعبر عن عمليتين (١) ، (٢) تحدثان في خلية نباتية :



(كتاب الامتحانات)

ماذا تمثل هاتان العمليتان ؟

- أ) عملية هدم و (١) عملية بناء.
- ب) (١) عملية هدم و (٢) عملية بناء.
- ج) كل من (١) ، (٢) عمليتا هدم.
- د) كل من (١) ، (٢) عمليتا بناء.



01026675233

44

إعداد : أ / أحمد شاهين





Sheet

علوم - متكاملة - نرم - أول

(كتاب الامتحانات)

٤٣) أى مما يلى تتوقع وجوده بكثرة فى خلايا عضلات الطيور ؟

- ١) الشبكة الإندوبلازمية . ٢) الميتوكوندريا . ٣) الفساء البلازمي . ٤) الفجوات .


٤٤) إذا تم استخلاص إنزيم ما من أحد أنواع البكتريا التي تعيش فى ينبع المياه الحارة الحمضية والتي تصل درجة حرارتها إلى 90° ، فأك الأسباب التالية يؤدي إلى توقف عمل هذا الإنزيم ؟

(كتاب الامتحانات)

- ١) زيادة تركيز المواد المتفاعلة . ٢) زيادة تركيز الإنزيم . ٣) زيادة الرقم الهيدروجيني للموسط . ٤) خفض درجة حرارة الوسط إلى 80°

٤٥) أى السكالم البيانية التالية يمثل العلاقة بين تركيز مادة التفاعل ونواتج التفاعل بمرور الزمن عند نشاط إنزيم ما عند الظروف المثلى لعمله ؟

(كتاب الامتحانات)



(كتاب الامتحانات)

٤٦) أى مما يأتى يوضع العلاقة بين pH ونشاط الإنزيم ؟

- ١) يزداد نشاط الإنزيم تدريجياً مع الارتفاع المستمر لـ pH
٢) يقل نشاط الإنزيم تدريجياً مع الارتفاع المستمر لـ pH
٣) يزداد نشاط الإنزيم تدريجياً ثم يقل مع الارتفاع المستمر لـ pH
٤) يزداد نشاط الإنزيم تدريجياً ثم يزداد مع الارتفاع المستمر لـ pH

(كتاب الامتحانات)

٤٧) أكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة من العبارات الآتية :

- ١) مادة هلامية يتكون معظمها من الماء وتحتوى على بعض المواد الكيميائية .
- ٢) لآكتات حبة مادتها الوراثية محاطة بغشاء نودي وتحتوى على عضيات متخصصة .
- ٣) الحد الأدنى من الطاقة اللازمة لبدء التفاعل الكيميائي .

(كتاب الامتحانات)

٤٨) يختلف أماكن تواجد الماء داخل وخارج خلايا الثدييات ... اسرع العبارة السابقة ؟

(كتاب الامتحانات)

٤٩) تارت بين الفجوات فى الخلية النباتية والفجوات فى الخلية الحيوانية ؟



01026675233

45

إعداد : أ / أحمد شاهين



حمل الآن

مجاناً وحصرياً

المراجعة رقم (4)

اختبار شهر اكتوبر



الدرس الاول (الغلاف المائي علي كوكب الارض)

- 1- عند سقوط اشعه الشمس على سطح الماء يتحول الماء من الحالة.....الى.....
 أ- صلبه الى سائله ب- غازيه الى سائله ج- سائله الى صلبه د- سائله الى غازيه
- 2- جميع ما يلي من مصادر المياه في مصر عدا
 أ- البحيرات ب- المحيطات ج- البحار د- الانهار
- 3- كل مما ياتي يوضح الى زياده نسبه بخار الماء في الهواء الجوي عدا
 أ- النتح في النبات ب - سقوط اشعه الشمس على البحار ج- تسريب المياه بين الصخور د- تنفس الكائنات الحيه
- 4- العمليه التي يتم في عوده الماء الموجود في الغلاف الجوي الي سطح الارض مره اخري
 أ- التبخر ب- التكثف ج- التساقط د- الجريان السطحي
- 5- أي من الصخور الاتيه يمكن ان تتسرب المياه خلاله لتكوين المياه الجوفيه
 أ- البازلت ب- الحجر الرملي ج- الجرانيت د- الرخام
- 6- تبلغ نسبة المياه المالحة من إجمالي الغلاف المائي على كوكب الأرض؟
 أ) 70% ب) 1% ج) 97% د) 3%
- 7- أي مما يلي يُعتبر مثلاً على المياه العذبة السائلة؟
 أ) الأنهار ب) البحار ج) المحيطات د) البحيرات المالحة
- 8- أي من المسطحات المائية التالية لا تُعد جزءاً من البيئة المائية المتنوعة في مصر؟
 أ) نهر النيل ب) خليج العقبة ج) البحر المتوسط د) المحيط الهادئ
- 9- ما هو الاسم العلمي لدورة الماء في الطبيعة؟
 أ) الدورة البيولوجية ب) الدورة الهيدرولوجية ج) الدورة الكيميائية د) الدورة الفيزيائية
- 10- العملية التي يتحول فيها الماء السائل إلى بخار ماء بفعل حرارة الشمس؟
 أ) التكثف ب) الهطول ج) التبخر د) النتح
- 11- تساهم النباتات في دورة الماء؟
 أ) من خلال عملية التكثف ب) من خلال عملية النتح ج) من خلال الجريان السطحي د) من خلال عملية الهطول
- 12- عندما يرتفع بخار الماء إلى طبقات الجو الباردة
 أ) يتبخر ب) يتجمد فوراً ج) يتسرب إلى التربة د) يتكثف مكوناً السحب

13. القوتان الأساسيتان اللتان تديران دورة الماء في الطبيعة؟

- (أ) الرياح والضغط الجوي
(ب) طاقة الشمس والجاذبية
(ج) المد والجزر
(د) دوران الأرض والرياح

14. تدفق الماء على سطح الأرض ليعود إلى الأنهار والمحيطات

- (أ) النفاذ
(ب) الجريان السطحي
(ج) التكثف
(د) التبخر

15. ما الذي يغذي الآبار والينابيع بالمياه؟

- (أ) التسرب
(ب) الجريان السطحي
(ج) الهطول المباشر
(د) مياه الأنهار

16. من أين يتبخر الماء بشكل أساسي أثناء عملية النتج في النبات؟

- (أ) من الجذور
(ب) من الثمار
(ج) من الأوراق
(د) من الأزهار

17. النسيج المسؤول عن سحب الماء لأعلى في ساق النبات؟

- (أ) نسيج الخشب
(ب) نسيج اللحاء
(ج) البشرة
(د) القشرة

18. أهميه قوة السحب التي يولدها النتج؟

- (أ) قوة تدفع الماء إلى الأسفل
(ب) قوة تساعد على رفع الماء الجذور لأعلى
(ج) قوة تفتح الثغور وتغلقها
(د) قوة تمنع تبخر الماء

19. أي من المواد التالية تُعتبر من الفضلات النيتروجينية الناتجة عن عمليات الأيض؟

- (أ) ثاني أكسيد الكربون
(ب) بخار الماء
(ج) اليوريا
(د) الأكسجين

20. تبدأ دورة النتج في النبات بعملية...

- (أ) تبخر الماء من الأوراق
(ب) سحب الساق للماء
(ج) فتح الثغور
(د) امتصاص الجذور للماء

21. النسبة المئوية للماء العذب الإجمالي على الأرض؟

- (أ) 1%
(ب) 2%
(ج) 3%
(د) 97%

22. أي مرحلة من مراحل دورة الماء تُعتبر عكس عملية التكثف بشكل مباشر؟

- (أ) الهطول
(ب) التبخر
(ج) النفاذ
(د) الجريان السطحي

23. أي العمليتين التاليتين تحدثان بفعل الجاذبية بشكل أساسي ضمن دورة الماء؟

- (أ) التبخر والنتج
(ب) التكثف والجريان السطحي
(ج) الهطول والتسرب
(د) التبخر والتكثف

24. أي مما يلي لا يعتبر نتيجة مباشرة لطاقة الشمس في دورة الماء؟

- (أ) تبخر مياه المحيطات
(ب) عملية النتج في النباتات.
(ج) الجريان السطحي للمياه
(د) ارتفاع بخار الماء لطبقات الجو العليا

اسئلته مقالیه متنوعه

- 1- فسر الدور البيولوجي للنباتات والحيوانات في الدورة الهيدرولوجية، مع ذكر نسب مساهمتها؟
الإجابة: النباتات: تساهم النباتات في عملية "النتح"، حيث تفقد الماء عبر مسامات أوراقها على شكل بخار ماء. الحيوانات: أثناء التنفس، تطلق الحيوانات بخار الماء إلى الغلاف الجوي.
تقدر مساهمة العمليات البيولوجية (النتح والتنفس) في توفير 10% من بخار الماء الموجود في الغلاف الجوي. بينما تشكل عمليات التبخر من المسطحات المائية 90% من بخار الماء
2. قدم ثلاث خواص للماء (كيميائية، فيزيائية، حيوية)
خاصية كيميائية (مذيب قطبي): قدرة الماء على إذابة العديد من المواد الكيميائية تسمح بنقل العناصر الغذائية والأملاح داخل الكائنات الحية والتخلص من الفضلات.
خاصية فيزيائية (ارتفاع الحرارة النوعية): قدرة الماء على امتصاص كميات كبيرة من الحرارة دون أن ترتفع درجة حرارته بشكل كبير تساعد على تنظيم درجة حرارة أجسام الكائنات الحية والمناخ على كوكب الأرض.
خاصية حيوية (النفاذية عبر الأغشية): قدرة الماء على المرور عبر أغشية الخلايا الحية تسمح بحدوث العمليات الحيوية الأساسية مثل امتصاص الغذاء والتخلص من الفضلات على المستوى الخلوي.
3. علل: يُعتبر الماء من أهم السوائل الحيوية للكائنات الحية.
لأنه وسط أساسي تتم فيه جميع التفاعلات الكيميائية داخل الكائنات الحية، ويؤثر على صحتها وبقائها.
4. ما الذي يميز كوكب الأرض عن باقي كواكب المجموعة الشمسية من حيث المياه؟
أن كوكب الأرض هو الكوكب الوحيد الذي يتميز بوجود غلاف مائي يشمل حوالي 70% من سطحه، مما يتيح وجود الحياة.
5. قارن بين المياه المالحة والمياه العذبة من حيث النسبة والمصادر.
المياه المالحة: تمثل حوالي 97% من مياه الأرض، وتوجد في المحيطات والبحار والبحيرات المالحة.
المياه العذبة: تمثل حوالي 1% فقط، وتوجد في الأنهار والبحيرات العذبة والمياه الجوفية.
6. فسر: لماذا توصف دورة الماء في الطبيعة بأنها نظام شبه مغلق؟
لأنها عملية مستمرة يتحرك فيها الماء بين حالاته الثلاث (صلبة، سائلة، غازية) في مسارات متكررة، دون أن يفقد أو يكتسب كميات كبيرة من خارج النظام الأرضي.

7. اشرح دور كل من العوامل الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية في حركة الماء بدورته.
فيزيائياً: يتحول الماء بين الحالات الثلاث (تبخر، تكاثف، تجمد).
كيميائياً: يتفاعل بخار الماء مع بعض المركبات مكوناً الأحماض (مثل الأمطار الحمضية).
بيولوجياً: يدخل في عمليات حيوية مثل النتح والإخراج في الكائنات الحية.
8. وضح الفرق بين عملية الإخراج وعملية النتح في الكائنات الحية.
الإخراج: عملية حيوية يتخلص فيها الكائن الحي من الفضلات الناتجة عن عمليات الأيض (مثل ثاني أكسيد الكربون، الأمونيا، اليوريا).
النتح: عملية فيزيائية بحتة يتخلص فيها النبات من الماء الزائد على شكل بخار ماء عبر الثغور.
9. ما أهم الفضلات الناتجة عن عمليات التمثيل الغذائي ؟
ثاني أكسيد الكربون + بخار الماء و الفضلات النيتروجينية مثل الأمونيا، اليوريا، وحمض البوليك
10. دور الثغور عملية النتح في النباتات؟
تسمح الثغور بخروج بخار الماء إلى الهواء، وتساعد في تنظيم كمية الماء داخل النبات.
11. ما أهمية النتح للنباتات ؟
يساعد على التخلص من الماء الزائد داخل النبات.
يحافظ على توازن الماء والأملاح داخل الأنسجة.
يساهم في خفض درجة حرارة النبات (يشبه التعرق عند الإنسان).
يُنشئ قوة سحب (قوة شد) تساعد على صعود الماء والأملاح من الجذور إلى الأوراق عبر الخشب.

الخواص الكيميائية للماء


1- الرابط المسؤوله عن ارتفاع درجه غليان الماء هي

أ- الرابطة 1

ب- الرابطة 2

ج- الرابطة 1 او 2

د- لا توجد اجابه صحيحه



2- اي الاملاح الاتيه يؤدي ذوبنا في الماء الى زياده قيمه ال PH

أ- ملح كربونات الصوديوم

ب- ملح كلوريد الصوديوم

ج- ملح كلوريد الامونيوم

د- ملح نترات البوتاسيوم

3- اعلى تركيز لايون الهيدروجين يوجد

أ- الماء المقطر

ب- ماء البحر

ج- ماء الامطار التي تؤدي الى تاكل المنشآت

د- ماء جوفي مذاع في كربونات البوتاسيوم

4- درجة حموضة ماء البحيرة الطبيعي تكون بين 6.5 فاذا سقطت الامطار الحمضيه علي هذه البحيره

يمكن ان تصبح قيمه ال PH الخاص بالبحيره

أ- 5

ب- 7

ج- 6.5

د- 8.5

5- السبب الذي يجعل الشكل الهندسي لجزء الماء منحنى هو

أ- النسبه بين الاكسجين والهيدروجين

ب- قيمه السالبه الكهربيه

ج- قيمه الزاويه بين الاكسجين والهيدروجين

د- الرابطة الهيدروجينيه

6- السبب وراء قطبيه الماء

أ- النسبه بين الاكسجين والهيدروجين

ب- قيمه السالبه الكهربيه

ج- قيمه الزاويه بين الاكسجين والهيدروجين

د- الرابطة الهيدروجينيه

7- اذا علمت ان الفرق في السالبه الكهربيه لعنصري جزئ ملح الطعام NaCl هو 2.23 فان هذا المركب

من المركبات

أ- القطبيه

ب- الايونيه

ج- الغير قطبيه

د- التساهميه

8- الروابط بين جزيئات الماء روابط

أ- تساهميه

ب- هيدروجينيه

ج- ايونيه

د- بيتيديه

9- عند تحليل كلوريد الامونيوم في الماء ينتج محلول قيمه ال PH الخاص به

- أ- 4 ب- 7 ج- 7.4 د- 8.5

10- محلول قيمه ال PH الخاص به 3 يكون اكثر قلويه من محلول ال PH الخاص به

- أ- 4 ب- 7 ج- 2 د- 8.5

11- قيمه ال PH الخاص بماء البحر المتوسط تساوي

- أ- 6.5 ب- 7 ج- 5 د- 8.5

12- أي المواد التاليه تحول ورقه عباد الشمس الي اللون الاحمر ؟

- أ- H_2O ب- $NaCl$ ج- NH_4Cl د- $NaHCO_3$

13- أي المواد التاليه تحول ورقه عباد الشمس الي اللون الازرق ؟

- أ- H_2O ب- $NaCl$ ج- NH_4Cl د- $NaHCO_3$

14- تعتمد قيمه ال PH للمياه الجوفيه علي كل مما ياتي ماعدا

- أ- نوع الصخور الرسوبيه ب- نوع التربه

ج- كميته املاح الكربونات الموجوده في التربه د- حجم المسام في الصخور الرسوبيه

15- تتكون الرابطه الهيدروجينيه بين جزيئات الماء بارتباط

أ- ذره هيدروجين في الجزء الاول مع ذره هيدروجين في الجزء الثاني

ب- ذره اكسجين في الجزء الاول مع ذره هيدروجين في الجزء الثاني

ج- ذره اكسجين في الجزء الاول مع ذره اكسجين في الجزء الثاني

د- ذره هيدروجين وذره اكسجين في نفس الجزء

16- الذي يفسر قدرة الماء على إذابة مركبات أيونية مثل ملح الطعام ($NaCl$) ؟

أ) ارتفاع درجة غليانه ب) قطبيه جزيء الماء

ج) وجود روابط تساهميه د) انخفاض حرارته النوعية

17- عند تحليل بيكربونات الصوديوم في الماء ينتج محلول قيمه ال PH الخاص به

- أ- 4 ب- 7 ج- 6.5 د- 8.5

18- النسبة المئوية التقريبية لكتلة الأكسجين في جزيء الماء الواحد؟

- أ) 11.11% ب) 50% ج) 66.67% د) 88.89%

19 الذي يجعل ذرة الأكسجين تحمل شحنة سالبة جزئية (δ^-) في جزيء الماء ؟
 (أ) صغر حجمها.

(ب) انخفاض سالبيتها الكهربائية مقارنة بالهيدروجين.

(ج) ارتفاع سالبيتها الكهربائية مقارنة بالهيدروجين.

(د) كتلتها الذرية الكبيرة.

20 عند إضافة ملح "أسيتات الصوديوم" (CH_3COONa) إلى ماء مقطر، أي من التغيرات التالية هو الأكثر احتمالاً؟

(أ) ينخفض الرقم الهيدروجيني pH

(ب) يرتفع الرقم الهيدروجيني pH

(ج) يبقى الرقم الهيدروجيني pH متعادلاً

(د) يتكون راسب أبيض من أسيتات الصوديوم.

21 النسبة بين ذرات الهيدروجين والأكسجين في جزيء الماء

(أ) 1:1

(ب) 1:2

(ج) 2:1

(د) 3:1

22 قياس الزاوية بين الروابط التساهمية في جزيء الماء؟

(أ) 90 درجة

(ب) 180 درجة

(ج) 109.5 درجة

(د) 104.5 درجة

23 "قدرة الذرة على جذب إلكترونات الرابطة الكيميائية نحوها" هو تعريف لـ:

(أ) القطبية

(ب) الرابطة التساهمية

(ج) السالبية الكهربائية

(د) الرابطة الهيدروجينية

24 نوع الشحنة الجزئية التي تتكون على ذرة الأكسجين في جزيء الماء؟

(أ) موجبة جزئية (δ^+)

(ب) سالبة جزئية (δ^-)

(ج) شحنة متعادلة

(د) شحنتان موجبتان

25 عدد جزيئات الماء التي يمكن لجزيء ماء واحد أن يرتبط بها عبر روابط هيدروجينية؟

(أ) جزيء واحد

(ب) جزيئان

(ج) ثلاثة جزيئات

(د) أربعة جزيئات

26 عندما يذوب ملح الطعام (NaCl) في الماء، أي جزء من جزيئات الماء يحيط بأيون الصوديوم الموجب (Na^+)؟

(أ) ذرات الأكسجين

(ب) ذرات الهيدروجين

(ج) جزيئات الماء ككل بشكل عشوائي

(د) لا يحدث إحاطة.

27 في الماء النقي المتعادل، ما هي العلاقة بين تركيز أيونات الهيدروجين (H^+) وأيونات الهيدروكسيد (OH^-)؟

(أ) تركيز H^+ أكبر من تركيز OH^- .

(ب) تركيز OH^- أكبر من تركيز H^+ .

(ج) تركيزهما متساوي.

(د) لا يوجد أيونات في الماء النقي.

28 تتكون الروابط حول ذرة الأكسجين في الماء من:

(أ) 4 روابط تساهمية

(ب) 4 روابط هيدروجينية

(ج) رابطتين تساهميتين ورابطتين هيدروجينيتين

(د) رابطة تساهمية و3 روابط هيدروجينية.

29 الروابط في جزيئات الماء روابط

أ- تساهمية

ب- هيدروجينية

ج- أيونية

د- بيتيديه

اسئلة مقالیه

1- كيف تؤثر قطبية الماء على قدرته كمذيب عام؟

الإجابة: قطبية الماء تجعله قادرًا على تكوين روابط هيدروجينية مع المواد القطبية، مما يساعد على إذابتها وتفكيكها إلى أيونات.

2. قارن بين الرابطة التساهمية داخل جزيء الماء والرابطة الهيدروجينية بين جزيئات الماء

الرابطة التساهمية: هي رابطة كيميائية قوية تحدث داخل جزيء الماء الواحد بين ذرة الأكسجين وذرتي الهيدروجين. وظيفتها هي الحفاظ على تركيب الجزيء نفسه (H_2O).

الرابطة الهيدروجينية: هي رابطة فيزيائية أضعف بكثير من الرابطة التساهمية، وتحدث بين جزيئات الماء المتجاورة. تنشأ نتيجة التجاذب بين الشحنة السالبة الجزئية على ذرة أكسجين في جزيء والشحنة الموجبة الجزئية على ذرة هيدروجين في جزيء آخر. وظيفتها هي المسؤولة عن الخواص الفريدة للماء مثل ارتفاع درجة غليانه وتوتره السطحي.

3. لديك ثلاثة محاليل مائية: (أ) ملح الطعام $NaCl$ ، (ب) بيكربونات الصوديوم $NaHCO_3$ ، (ج) كلوريد الأمونيوم NH_4Cl . توقع تأثير كل محلول على ورقة عباد الشمس وقيمة الـ pH، مع تفسير السبب. الإجابة:

(أ) محلول $NaCl$: متعادل، لا يؤثر على ورقة عباد الشمس، والـ pH يساوي 7 تقريباً. السبب: لأنه ملح مشتق من حمض قوي (HCl) وقاعدة قوية ($NaOH$).

(ب) محلول $NaHCO_3$: قاعدي، يزرق ورقة عباد الشمس الحمراء، والـ pH أكبر من 7. السبب: لأنه ملح مشتق من قاعدة قوية ($NaOH$) وحمض ضعيف (H_2CO_3)، فتأثير القاعدة هو السائد.

(ج) محلول NH_4Cl : حمضي، يحمر ورقة عباد الشمس الزرقاء، والـ pH أقل من 7. السبب: لأنه ملح مشتق من حمض قوي (HCl) وقاعدة ضعيفة (NH_4OH)، فتأثير الحمض هو السائد.

4. علل: لماذا تختلف قيمة الرقم الهيدروجيني (pH) للمياه الطبيعية (ماء عذب، ماء بحر، سحب) عن الماء المقطر النقي؟

الماء المقطر النقي متعادل تماماً (pH=7) لأنه خالٍ من أي شوائب أو أملاح ذائبة. أما المياه الطبيعية فتختلف قيمة الـ pH لها بسبب تفاعلها مع البيئة المحيطة:

ماء السحب: يمكن أن يكون حمضياً (pH 4.5-5) بسبب ذوبان غازات حمضية من الغلاف الجوي مثل ثاني أكسيد الكربون.

الماء العذب: يتراوح الـ pH له (6.5-8.5) بسبب ذوبان معادن وأملاح من الصخور والتربة التي يمر عبرها. ماء البحر: قاعدي (pH 7.5-8.5) بسبب تركيزه العالي من الأملاح القاعدية الذائبة مثل كربونات الكالسيوم.

5. صف التركيب الكيميائي لجزيء الماء، موضحاً النسبة بين ذراته، وسبب قطبيته. يتكون جزيء الماء من ذرتي هيدروجين وذرة أكسجين واحدة بنسبة 2:1. وهو جزيء قطبي بسبب ارتفاع السالبية الكهربية للأكسجين مقارنة بالهيدروجين، مما يؤدي إلى تكون شحنة سالبة جزئية على الأكسجين وشحنات موجبة جزئية على ذرتي الهيدروجين.

6. كيف تؤثر الرابطة الهيدروجينية على خواص الماء؟

ترفع درجة غليان الماء وتجعله مذيباً جيداً للمواد القطبية والأيونية.

7. كيف يقوم الماء بتفكيك وإذابة المركبات الأيونية مثل كلوريد الصوديوم؟

الإجابة:

يقوم الماء بتفكيك الشبكة البلورية للملح عن طريق جذب الأيونات الموجبة (مثل Na^+) بقطبه السالب (جهة الأكسجين)، والأيونات السالبة (مثل Cl^-) بقطبه الموجب (جهة الهيدروجين). ثم تحيط جزيئات الماء بالأيونات وتمنعها من الارتباط مرة أخرى، مما يؤدي إلى الذوبان.

8. علل: درجة غليان الماء (100°م) أعلى من درجة غليان كبريتيد الهيدروجين (-60°م) رغم تشابه التركيب الجزيئي.

لأن الماء يكون روابط هيدروجينية قوية بين جزيئاته تحتاج إلى طاقة كبيرة لكسرها، بينما كبريتيد الهيدروجين لا يكون روابط هيدروجينية قوية، لذا تكون درجة غليانه منخفضة.

الخصائص الفيزيائية للماء

1- ما هو التعريف الأساسي للموائع؟

- (أ) مواد صلبة تتخذ شكل الوعاء
(ب) مواد يمكنها التدفق وتأخذ شكل الوعاء
(ج) مواد غازية فقط
(د) مواد قابلة للتجمد فقط

2- كيف يؤثر الضغط العالي على كثافة الماء عند الغمر في أعماق المحيط؟

- (أ) يزيد الكثافة بشكل كبير
(ب) لا يؤثر على الكثافة
(ج) ينقص الكثافة
(د) يتسبب في تغير الحالة

3- ما هو تأثير إضافة السكر إلى الماء على كثافته مقارنة بإضافة الملح؟

- (أ) السكر يرفع الكثافة أكثر
(ب) الملح يرفع الكثافة أكثر
(ج) كلاهما يؤثر بنفس القدر
(د) لا يؤثر أي منهما

4- لماذا تُعتبر الحرارة النوعية للماء عالية مقارنةً بالمواد الأخرى؟

- (أ) بسبب حجمه الكبير.
(ب) بسبب كثافته العالية.
(ج) بسبب الروابط الهيدروجينية بين جزيئات الماء.
(د) بسبب لون الماء.

5- أي من هذه العمليات تحدث تغييرًا في كثافة الماء؟

- (أ) التبخر
(ب) التجمد
(ج) التكثف
(د) جميع ما سبق

6- ما تأثير الكثافة على ظاهرة "التيارات البحرية" في المحيطات؟

- (أ) التيارات تنتج عن اختلاف الكثافة
(ب) لا علاقة بين الكثافة والتيارات البحرية
(ج) التيارات تعمل على تقليل الكثافة
(د) الكثافة تؤثر فقط على الكائنات البحرية

7- الجدول التالي يوضح درجات الحرارة النوعية لبعض المواد ،

المادة	الحرارة النوعية كج/ك.أ
الماء سائل H_2O	4.184
ثلج Ice	2.000
الكحول الإيثيلي C_2H_5OH	2.430
كلوريد الصوديوم $NaCl$	0.774

أي هذه المواد هي الأسرع في التغير في درجة الحرارة

- (أ) الماء
(ب) الثلج

- (ج) الكحول الإيثيلي
(د) كلوريد الصوديوم

8- إذا كان لديك سائل ذو كثافة 0.6 g/cm^3 ، كيف سيكون تأثيره عند خلطه مع الماء؟

- (أ) سيغرق
(ب) سيطفو
(ج) سيبقى في القاع
(د) سيتبخّر

9- كيف تتغير كثافة الماء إذا زاد الضغط عند درجة حرارة ثابتة؟

- (أ) تزداد
(ب) تنقص
(ج) لا تتغير
(د) تختلف حسب درجة الحرارة

10 لماذا تطفو قطع الجليد على سطح الماء بالرغم من أن الماء في الحالة الصلبة؟

- أ- لأن كثافة الجليد أعلى من كثافة الماء السائل.
 ب- لأن كثافة الجليد أقل من كثافة الماء السائل.
 ج- بسبب التوتر السطحي للماء.
 د- لأن درجة حرارة الماء المحيط أقل.

11 ما هو سبب انخفاض كثافة الماء عند التجمد؟

- أ- انخفاض درجة الحرارة.
 ب- تكوين بنية بلورية تستهلك حجمًا أكبر.
 ج- زيادة التوتر السطحي.
 د- زيادة الطاقة الحركية لجزيئات الماء.

12 كيف تتأثر كثافة الماء في المناطق القطبية مقارنة بالمناطق الاستوائية؟

- أ- الكثافة أعلى في المناطق القطبية.
 ب- الكثافة أعلى في المناطق الاستوائية.
 ج- الكثافة متساوية في كلتا المنطقتين.
 د- لا يمكن تحديد ذلك.

13 إذا كانت الكثافة النسبية لمادة معينة هي 0.8، فماذا يعني ذلك؟

- أ) المادة أكثر كثافة من الماء
 ب) المادة أقل كثافة من الماء
 ج) المادة تساوي كثافة الماء
 د) المادة تساوي كثافة الهواء

14 إذا كانت الكثافة النسبية لسائل ما هي 1.2، فماذا يحدث إذا وضعت فيه قطعة خشب؟

- أ- ستغرق
 ب- ستطفو
 ج- ستبقى معلقة
 د- تعتمد على نوع الخشب

15 ما هو السبب وراء عدم وجود وحدة قياس للكثافة النسبية؟

- أ- لأنها تعتمد على النسبة بين كثافتين.
 ب- لأنها تقاس بوحدات الكتلة فقط.
 ج- لأنها تعتمد على الحجم.
 د- لأنها تقاس بوحدات الضغط.

16 أي من الغازات التالية له كثافة نسبية أقل من 1 مقارنةً بالهواء؟

- أ- الأكسجين
 ب- ثاني أكسيد الكربون
 ج- الهيليوم
 د- النيتروجين

17 الشكل المقابل يمثل جهاز الهيدروميتر اجب عن الاسئلة التالية :

1- أي من المواد التالية يمكن قياس كثافتها باستخدام الجهاز؟


- أ- الزيت
 ب- العسل
 ج- الحليب
 د- جميع ما سبق

2- مما يتكون الجزء السفلي لجهاز الهيدروميتر؟

- أ- مواد خفيفة
 ب- مواد ثقيلة
 ج- زجاج
 د- بلاستيك

3- أي من الأجزاء التالية يستخدم لقراءة قياس الكثافة على الهيدروميتر؟

- أ- الأنبوب الزجاجي
 ب- الوزن الثقيل
 ج- السهم المؤشر
 د- القاعدة



18 ما هو تأثير التيارات المحيطية على الحياة البحرية؟

- أ- تؤثر على توزيع الأسماك
ب- تؤثر على مواطن الكائنات البحرية
ج- تؤثر على تكاثر الكائنات البحرية
د- جميع ما سبق

19 ما هو الفرق بين التيارات السطحية والتيارات العميقة في المحيطات؟

- أ) السطحية تتحرك ببطء، والعميقة تتحرك بسرعة
ب) السطحية تتأثر بالرياح، والعميقة تتأثر بالاختلاف في الكثافة
ج) لا يوجد فرق بينهما
د) السطحية تسبب في تدفق مياه الشرب

20 ما هو السبب الرئيسي وراء حركة التيارات في المحيطات؟

- أ- تأثير الجاذبية
ب- تأثير الرياح
ج- اختلاف الكثافة
د- جميع ما سبق

21 ما هو تأثير التيارات العميقة على توزيع العناصر الغذائية في المحيطات؟

- أ) نقل العناصر الغذائية من الأعماق إلى السطح
ب) تعزيز النمو الطحلي في المناطق العميقة
ج) تقليل تركيز العناصر الغذائية في الأعماق
د) لا تؤثر على توزيع العناصر الغذائية

22 ما هو تأثير الأمطار المتساقطة على كثافة الماء في المناطق القطبية؟

- أ- تزيد الكثافة
ب- تقلل الكثافة
ج- لا تؤثر على الكثافة
د- تؤدي إلى تجمد الماء

23 كيف تؤثر الكثافة المختلفة للمياه العذبة والمياه المالحة على حركة المياه في المحيطات القطبية؟

- أ- لا تؤثر على الحركة
ب- تؤدي إلى اختلاط المياه
ج- تؤدي إلى تمايز المياه
د- تؤدي إلى تقليل الكثافة

24 كيف يؤثر ارتفاع مستوى سطح البحر نتيجة ذوبان الجليد على كثافة الماء في المحيطات؟

- أ) يزيد من كثافة الماء
ب) يؤثر فقط على مياه الأنهار
ج) لا يؤثر على كثافة الماء
د) يقلل من كثافة الماء

25 ما العلاقة بين كثافة الماء والضغط الجوي في أعماق المحيطات القطبية؟

- أ) زيادة الضغط تؤدي إلى زيادة الكثافة
ب) الضغط لا يؤثر على كثافة الماء
ج) زيادة الضغط تقلل من الكثافة
د) الضغط الجوي غير ذي صلة بكثافة الماء

26 أي العوامل التالية يؤدي إلى زيادة كثافة مياه المحيطات؟

- أ) زيادة درجة الحرارة وزيادة الملوحة.
ب) انخفاض درجة الحرارة وزيادة الملوحة.
ج) زيادة درجة الحرارة وانخفاض الملوحة.
د) انخفاض درجة الحرارة وانخفاض الملوحة.

27 تم أخذ عينتين من الماء، (أ) من سطح بحيرة متجمدة في القطب الشمالي و (ب) من قاع نفس البحيرة. عند قياس الكثافة، ماذا نتوقع؟

(أ) كثافة العينة (ب) أعلى من كثافة العينة (أ)

(ب) كثافة العينة (أ) أعلى من كثافة العينة (ب)

(ج) كثافة العينتين متساوية تماماً.

(د) لا يمكن التنبؤ دون معرفة الضغط الجوي.

28 عندما تصب مياه الأنهار العذبة في المحيط، فإنها

(أ) تتجمد فوراً.

(ب) تزيد ملوحة المياه السطحية.

(ج) تغوص مباشرة إلى قاع المحيط

(د) تنتشر على سطح مياه المحيط.

29 ماذا يحدث لحجم الماء عند تحوله من الحالة السائلة عند 4°C إلى الحالة الصلبة عند 0°C ؟

(أ) يزداد (ب) يقل (ج) يبقى ثابتاً (د) يقل ثم يزداد

30 تنشأ التيارات المائية في المحيطات بشكل أساسي نتيجة اختلاف...

(أ) الضغط الجوي (ب) سرعة الرياح (ج) كثافة المياه (د) عمق المحيط

31 كيف تؤثر التغيرات الحرارية على توزيع الكائنات البحرية؟


(أ) تؤدي إلى ازدهار الكائنات في جميع الأعماق

(ب) تؤدي إلى توزيع مختلف للكائنات

(ج) تؤدي إلى تدمير جميع الكائنات البحرية

(د) لا تؤثر على الكائنات البحرية

32 الشكل المقابل يوضح العلاقة بين كمية الحرارة التي تكتسبها مادة كتلتها 2Kg ودرجة حرارة المادة ،



وبالتالي تكون الحرارة النوعية

(أ) 50

(ب) 200

(ج) 100

(د) 400

33 ما هي الطاقة الداخلية في الأجسام؟

(أ) الطاقة الناتجة عن الحركة فقط

(ب) الطاقة الناتجة عن الوضع فقط

(ج) مجموع طاقة الوضع والحركة للجزيئات

(د) الطاقة الناتجة عن التفاعل الكيميائي

(أ) لا يؤثر

(ب) يمنعها من الحركة

(ج) يحسن من صحتها

(د) يزيد من نشاطها

35 ما هو تأثير تيار الخليج على المناخ في أوروبا الغربية؟

أ. يزيد من برودة المناخ

ب. يزيد من ملوحة المياه

ج. يقلل من نسبة الرطوبة

د. يساهم في اعتدال المناخ

36 ما هو السبب وراء امتلاك الماء لحرارة نوعية مرتفعة؟

(أ) بسبب وزنه الثقيل

(ب) بسبب سالييه الكهربي

(ج) بسبب الزاوية بين ذرتي الهيدروجين

(د) بسبب الروابط الهيدروجينية

37 إذا أردنا تسخين 0.3 كجم من النحاس من 20°C إلى 70°C ، وكانت الحرارة النوعية للنحاس 385

J/kg.K، فما هي كمية الحرارة اللازمة؟


أ. 5775 J

ب. 385 J


ج. 70 J

د. 0.3 J


38 أي الأشكال التالية تمثل العلاقة بين كتلة المادة وحرارتها النوعية ؟




د



ج



ب



أ

39 ما هو تعريف الكائنات ذات الدم الحار (Homeotherms)؟

(أ) كائنات تغير درجة حرارتها بناءً على البيئة المحيطة

(ب) كائنات تعتمد على المياه الدافئة للعيش

(ج) كائنات تحافظ على درجة حرارة أجسامها ثابتة بغض النظر عن البيئة

(د) كائنات تعيش في المناطق الباردة فقط

40 للحرارة الكامنة للتصعيد هي ؟

(أ) الطاقة اللازمة لرفع درجة حرارة 1 كجم من السائل درجة مئوية واحدة.

(ب) الطاقة اللازمة لتحويل 1 كجم من المادة من الحالة السائلة إلى الغازية عند درجة حرارة ثابتة.

(ج) الطاقة المنطلقة عند تحول المادة من الحالة الصلبة إلى السائلة.

(د) الطاقة اللازمة لتحويل 1 كجم من المادة من الحالة الغازية إلى السائلة عند درجة حرارة ثابتة.

41 عند وصول الماء إلى 100 درجة مئوية، ماذا يحدث عند إضافة المزيد من الطاقة الحرارية إليه؟

(أ) ترتفع درجة حرارة الماء بشكل أسرع.

(ب) تبدأ درجة حرارة الماء بالانخفاض.

(ج) يتحول الماء إلى بخار دون تغير في درجة حرارته.

(د) تتجمد جزيئات الماء.

42 السبب الرئيسي لارتفاع قيمة الحرارة الكامنة للتصعيد للماء؟

(أ) ضعف الروابط بين جزيئات الماء

(ب) وجود الروابط الهيدروجينية

(ج) درجة غليان الماء

(د) كتلة جزيء الماء

43 كيف تستفيد الكائنات الحية من عملية تبخر الماء؟

(أ) خفض درجة حرارة أجسامها

(ب) لزيادة درجة حرارة أجسامها.

(ج) لإنتاج الطاقة اللازمة للحركة

(د) لامتصاص الماء من البيئة.

44 ادرس الشكل المقابل ثم اجب


1. في الرسم البياني، أي منطقة تمثل الحرارة الكامنة للتصعيد (تحول الماء من سائل إلى بخار)؟

(أ) المنطقة A.

(ب) المنطقة B.

(ج) المنطقة C.

(د) لا توجد منطقة تمثل ذلك.



2. ماذا يمثل المحور الرأسي (Y-axis) في الرسم البياني؟

(أ) الطاقة المضافة بالجول

(ب) درجة الحرارة بالدرجة المئوية.

(ج) الزمن بالثواني

(د) كمية الماء بالجرام.

3. وفقًا للرسم البياني، ماذا يحدث في المنطقة B؟

(أ) يبقى الماء في حالته الصلبة

(ب) يتحول الماء من سائل إلى بخار

(ج) يتكثف بخار الماء إلى سائل

(د) ترتفع درجة حرارة الماء السائل من 0 إلى 100 درجة مئوية.

4. عند مقارنة كمية الطاقة في المنطقتين B و C، نستنتج أن

(أ) الطاقة اللازمة لرفع درجة حرارة الماء (B) أكبر من الطاقة اللازمة لتبخيره (C).

(ب) الطاقة اللازمة لتبخير الماء (C) أكبر بكثير من الطاقة اللازمة لرفع درجة حرارته (B).

(ج) كمية الطاقة في المنطقتين متساوية.

(د) لا يمكن المقارنة بينهما من الرسم.

45 الظاهرة التي تحدث في النباتات وتعتمد على الحرارة الكامنة للتصعيد لتبريدها؟

- (أ) النتح (ب) التنفس الخلوي (ج) البناء الضوئي (د) امتصاص الجذور للماء

46 ما هو تأثير الحرارة النوعية العالية للماء على البيئة البحرية؟

- (أ) تسبب ارتفاعاً كبيراً في درجة الحرارة (ب) تساعد في استقرار درجة الحرارة

- (ج) تسبب انخفاضاً كبيراً في درجة الحرارة (د) تزيد من ملوحة الماء

47 أي من الكائنات التالية يمكنها الحفاظ على حرارة أجسامها بغض النظر عن البيئة المحيطة؟

- أ. الأسماك ب. الطحالب

- ج. الحيتان د. الشعاب المرجانية

48 ما هي الحرارة النوعية للماء السائل مقارنة بالجليد وبخار الماء؟

- (أ) الماء السائل يمتلك حرارة نوعية أقل (ب) الماء السائل يمتلك حرارة نوعية أعلى

- (ج) الجليد يمتلك حرارة نوعية أعلى (د) بخار الماء يمتلك حرارة نوعية أعلى

49 ما هو تأثير ارتفاع درجة الحرارة على الشعاب المرجانية؟

- (أ) تزيد من نمو الشعاب (ب) لا تؤثر على الشعاب المرجانية

- (ج) تقلل من نمو الشعاب (د) تسبب ابيضاضها

50 لماذا تعتبر الحرارة النوعية العالية للماء ضرورية للحياة على الأرض؟

- (أ) لأنها تجعل الماء أكثر شدة في التسخين.

- (ب) لأنها تمنع التغيرات المفاجئة في درجة الحرارة

- (ج) لأنها تساعد على تبخر الماء بسرعة.

- (د) لأنها تزيد من نسبة الأكسجين في الماء.

51 إذا كانت الحرارة النوعية لمادة A أعلى من الحرارة النوعية لمادة B، ماذا يمكن أن نستنتج عن سلوك

هاتين المادتين عند التسخين؟

- (أ) ستسخن المادة A أسرع من B. (ب) ستسخن المادة B أسرع من A.

- (ج) ستسخن المادتان بنفس السرعة. (د) يعتمد ذلك على الكتلة فقط.

52 في التجربة، تم قياس الحرارة النوعية لمادة معينة ووجدت أنها 2000 J/kg.K. ماذا يمكن أن نستنتج

عن قدرة هذه المادة على تخزين الحرارة مقارنة بمادة أخرى لها حرارة نوعية 1000 J/kg.K؟

- (أ) المادة الأولى تخزن حرارة أكثر. (ب) المادة الأولى تخزن حرارة أقل.

- (ج) لا توجد علاقة بين القيمتين. (د) كلاهما يخزن نفس الكمية

53 ما هي العلاقة بين درجة الحرارة بالسيلسيوس والكلفن

أ. $K = ^\circ C + 100$

ب. $K = ^\circ C - 273$

ج. $K = ^\circ C + 273$

د. $K = ^\circ C \times 10$

54 ما هي وحدة قياس الحرارة النوعية؟

(د) سيلسيوس

(ج) جول

(ب) ج/ك.ج

(أ) كلفن

55 أي من الحالات التالية لها أكبر قيمة للحرارة النوعية للماء؟

(د) الماء المتجمد

(ج) الماء السائل

(ب) الجليد

(أ) بخار الماء

اسئله مقالیه متنوعه

1- إذا كانت كثافة مادة A هي 2.5 جرام/سم³، وكثافة مادة B هي 1.5 جرام/سم³، أي من المادتين ستطفو فوق الأخرى عند وضعها في سائل؟

الماده B

2- إذا كانت كثافة الجليد 0.9 جرام/سم³، فما هي الكتلة لقطعة من الجليد حجمها 200 سم³؟
 $180 = 200 \times 0.9$ جرام



3- الصورة التي امام تعبر عن نشاط الصيد في المناطق القطبيه ما الخاصيه التي ساعدت علي نجاه الكائنات التي تعيش في هذه المناطق
 نقصان كثافه الماء عند التجمد

4- قارن بين كثافة الماء في حالاته الثلاث (الصلبة، والسائلة، والغازية)

وناقش تأثير ذلك على البيئة. كيف يمكن أن تؤثر هذه التغيرات في الكثافة على الأنظمة البيئية؟
 كثافة الماء تختلف في حالاته الثلاث:

الحالة الصلبة (الثلج) أقل كثافة من الحالة السائلة، مما يسمح للثلج بالطفو على الماء.

الحالة الغازية (البخار) أقل كثافة من السائل، مما يؤدي إلى تصاعد البخار.

هذه التغيرات تؤثر على الأنظمة البيئية، حيث يوفر الثلج عزلاً للبحيرات والأنهار في الشتاء، مما يحافظ على الحياة المائية.

5- اشرح كيف يؤثر اختلاف كثافة الماء العذب والمالح على حركة المحيطات والتيارات البحرية. كيف يمكن أن تؤثر هذه الظواهر على المناخ العالمي؟

اختلاف كثافة الماء العذب (1 جرام/سم³) والمالح (1.025 جرام/سم³) يؤدي إلى تشكيل تيارات بحرية مثل تيار الخليج. هذه الظواهر تؤثر على المناخ العالمي، حيث تلعب دوراً في نقل الحرارة من المناطق الاستوائية إلى المناطق القطبية.

6. صف تركيب جهاز الهيدروميتر موضحاً وظيفة كل جزء.
الإجابة: يتكون الهيدروميتر من ثلاثة أجزاء رئيسية:

مستودع زجاجي مجوف: جزء سفلي عريض ومحكم الغلق يساعد الجهاز على الطفو.
كرات من الرصاص أو الزئبق: توجد في قاعدة المستودع لزيادة وزنه والمساعدة على اتزانه بشكل رأسي في السائل.

ساق زجاجي رفيع ومدرج: يتصل بالمستودع ويحتوي على تدريج للكثافة. يغوص الجهاز في السائل لمستوى معين، ويتم قراءة الكثافة مباشرة من التدريج عند سطح السائل.

7- ما السبب الذي يجعل درجه غليان الماء مرتفعه عن باقي المواد
بسبب الروابط الهيدروجينية

8- علل تلعب الحراره النوعيه للماء دورا هاما في الثبات النسبي لدرجه حراره المحيطات والبحار
المياه تمتص كميات كبيرة من الطاقة الشمسية خلال النهار، وتحررها ببطء في الليل مما يساعد في استقرار البيئة البحرية.

9- قارن بين الكائنات ذوات الدم البارد وذوات الدم الحار

الكائنات ذات الدم البارد	الكائنات ذوات الدم الحار
* تعتمد درجة حرارة جسمها على درجة حرارة البيئة المحيطة بها لهذا السبب، غالبا ما تجد هذه الكائنات في أعماق البحار والمحيطات حيث تكون درجة الحرارة مستقرة . * مثل: البرمائيات والزواحف واللافقاريات ومعظم الأسماك.	* تعرف أيضا اسم داخلية الحرارة، وتحتفظ هذه الحيوانات بدرجة حرارة جسمها بغض النظر عن حرارة الوسط الموجودة فيه مثل الطيور والثدييات

10- احسب كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة 0.3 kg من النحاس من 200 درجة سليزية إلى 70 درجة سليزية مع العلم أن الحرارة النوعية للنحاس = 385 J/kg. K

الحل

$$Q_{th} = m \Delta t = 0.3 \times 385 \times (70-20) = 5775$$

11. قطعة من الجرانيت كتلتها 150 جرام وحجمها 50 سم³. هل تطفو هذه القطعة أم تغوص في الماء؟
(علماً بأن كثافة الماء النقي = 1 جم/سم³).

الحل:

لحساب كثافة قطعة الجرانيت، نستخدم القانون: الكثافة = الكتلة / الحجم.

$$\text{الكثافة} = 150 \text{ جم} / 50 \text{ سم}^3 = 3 \text{ جم/سم}^3$$

بمقارنة كثافة الجرانيت (3 جم/سم³) بكثافة الماء (1 جم/سم³)، نجد أنها أكبر.

لذلك، تغوص قطعة الجرانيت في الماء.

12. سائل كتلته 800 كجم وحجمه 1 م³. ما هي الكثافة النسبية لهذا السائل؟ (علماً بأن كثافة الماء = 1000 كجم/م³).

الحل:

أولاً، نحسب كثافة السائل: الكثافة = الكتلة / الحجم.

$$\text{كثافة السائل} = 800 \text{ كجم} / 1 \text{ م}^3 = 800 \text{ كجم/م}^3$$

ثانياً، نحسب الكثافة النسبية: الكثافة النسبية = كثافة المادة / كثافة الماء.

$$\text{الكثافة النسبية} = 800 / 1000 = 0.8 \text{ (وهي بدون وحدة قياس).}$$

13. إذا علمت أن كثافة الألومنيوم تساوي 2700 كجم/م³، فما هو حجم قطعة ألومنيوم كتلتها 54 كجم؟

الحل:

باستخدام قانون الكثافة (الكثافة = الكتلة / الحجم)، يمكننا إعادة ترتيبه لحساب الحجم: الحجم = الكتلة / الكثافة.

$$\text{الحجم} = 54 \text{ كجم} / 2700 \text{ كجم/م}^3 = 0.02 \text{ م}^3$$

14. سُخِّنَ ماء من درجة حرارة 20°م إلى 90°م. ما هو مقدار التغير في درجة الحرارة بوحدة الكلفن؟

الحل:

مقدار التغير في درجة الحرارة بالدرجة المئوية (السيليزية) هو: $\Delta T = 90^\circ\text{م} - 20^\circ\text{م} = 70^\circ\text{م}$.

بما أن الفرق بين كل درجة على مقياس سيليزيوس هو نفسه الفرق على مقياس كلفن، فإن التغير في درجة الحرارة يكون متساوياً على كلا المقياسين.

إذن، مقدار التغير في درجة الحرارة هو 70 كلفن.

15. غاز درجة حرارته 350 كلفن. ما هي درجة حرارته بالدرجة المئوية (السيليزية)؟
الحل:

لتحويل درجة الحرارة من كلفن إلى سيليزيوس، نستخدم العلاقة: $C = K - 273$.
 $77^{\circ} = 350 - 273 = C$.

ثالثاً: مسائل على كمية الحرارة ($Q = m.c.\Delta T$)

16. احسب كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة 2 كجم من الماء من $15^{\circ}C$ إلى $65^{\circ}C$. (علماً بأن الحرارة النوعية للماء $c = 4180 \text{ J/kg.K}$).
الحل:

نستخدم قانون كمية الحرارة: $Q = m * c * \Delta T$.

أولاً، نحسب التغير في درجة الحرارة: $\Delta T = 65^{\circ}C - 15^{\circ}C = 50^{\circ}C$ (وهو ما يعادل 50 كلفن).
الآن نعوض في القانون: $Q = 2 \text{ كجم} * 4180 \text{ J/kg.K} * 50$ كلفن.
كمية الحرارة اللازمة هي 418,000 جول.

17. قطعة من النحاس كتلتها 500 جرام اكتسبت كمية حرارة مقدارها 9625 جول، فارتفعت درجة حرارتها من $25^{\circ}C$ إلى $75^{\circ}C$. احسب الحرارة النوعية للنحاس.
الحل:

نعيد ترتيب قانون كمية الحرارة لحساب الحرارة النوعية: $c = Q / (m * \Delta T)$

أولاً، نحول الكتلة من الجرام إلى الكيلوجرام: 500 جم = 0.5 كجم.
ثانياً، نحسب التغير في درجة الحرارة: $\Delta T = 75^{\circ}C - 25^{\circ}C = 50^{\circ}C$ (أو 50 كلفن).
نعوض في القانون: $c = 9625 \text{ جول} / (0.5 \text{ كجم} * 50 \text{ كلفن})$.
الحرارة النوعية للنحاس هي 385 J/kg.K .

18. قطعة من الألومنيوم كتلتها 200 جرام ودرجة حرارتها الابتدائية 90°م، وُضعت في كمية من الماء البارد. إذا كانت درجة الحرارة النهائية للماء والألومنيوم معاً هي 30°م، فاحسب كمية الحرارة التي فقدتها قطعة الألومنيوم. (علماً بأن الحرارة النوعية للألومنيوم $c = 897 \text{ J/kg.K}$).

الحل:

نستخدم قانون كمية الحرارة: $Q = m * c * \Delta T$.

أولاً، نحول الكتلة إلى الكيلوجرام: 200 جم = 0.2 كجم.

ثانياً، نحسب التغير في درجة الحرارة: $\Delta T = \text{درجة الحرارة النهائية} - \text{درجة الحرارة الابتدائية} = 30^\circ\text{م} - 90^\circ\text{م} = -60^\circ\text{م}$ (أو -60 كلفن).

نعوض في القانون: $Q = 0.2 \text{ كجم} * (-60 * 897 \text{ J/kg.K}) = -10764 \text{ جول}$.

الإشارة السالبة تدل على أن قطعة الألومنيوم فقدت كمية من الحرارة مقدارها 10764 جول.

المحاليل المائية وخواصها

- 1- ما التغير الذي يحدث في ضغط بخار الماء عند إضافة مادة مذابة؟
 (أ) يزداد ضغط البخار
 (ب) يقل ضغط البخار
 (ج) يظل ثابتاً
 (د) يزداد عند درجات حرارة منخفضة فقط
- 2- كيف تؤثر قوى الترابط بين جزيئات المذاب والمذيب على درجة غليان المحلول؟
 (أ) تزيد درجة الغليان
 (ب) تقلص درجة الغليان
 (ج) تجعلها تقترب من 100 درجة
 (د) لا تؤثر على درجة الغليان
- 3- لماذا ينخفض الضغط الأسموزي في المياه العذبة بالنسبة للبحرية؟
 (أ) بسبب قلة الأملاح
 (ب) بسبب كثافة المياه
 (ج) بسبب حرارة الماء
 (د) بسبب نقص الأكسجين
- 4- ماذا يحدث للماء إذا وضع في حلة الضغط؟
 (أ) يغلي عند درجة حرارة أقل
 (ب) تجمده يرتفع
 (ج) تجمده ينخفض
 (د) يغلي عند درجة حرارة أعلى
- 5- ما الذي يُقصد بخصائص الماء "الجمعية" في المحاليل؟
 (أ) تعتمد على نوع المذاب
 (ب) تعتمد على تركيز المذيب
 (ج) تعتمد على عدد جسيمات المذاب
 (د) تعتمد على نوع المذيب وجزيئاته
- 6- الضغط الأسموزي في الكائنات الحية في البيئات المائية يعتمد على:
 (أ) تركيز الماء فقط
 (ب) تركيز المذاب فقط
 (ج) الفرق في التركيز بين المحلولين
 (د) درجة الحرارة فقط
- 7- لماذا تكون درجة غليان المحلول أعلى من الماء النقي؟
 (أ) لتقليل الطاقة اللازمة للتبخير
 (ب) لأن المذيب خفيف
 (ج) لزيادة قوى التجاذب بين الجزيئات
 (د) لأن المذاب يزيد من الكتلة
- 8- ما هي درجة تجمد المحلول مقارنةً بالماء النقي؟
 (أ) أعلى
 (ب) أقل
 (ج) متساوية
 (د) غير معروفة
- 9- الماء في حلة الضغط يغلي عند درجة حرارة
 (أ) أقل من 100 c
 (ب) أكبر من 100 c
 (ج) تساوى 100 c
 (د) أقل من 20

10) الارتفاع في درجة غليان المحلول يتناسب..... مع عدد الأيونات المذابة فيه

(أ) طرديا (ب) عكسيا (ج) تناقصيا (د) لا يمكن تحديد الإجابة

11) يتحول الماء السائل إلى بخار ماء عند درجة حرارة..... K.

(أ) 0 (ب) 100 (ج) 273 (د) 373

12) الماء النقي فوق قمة جبل يغلي عند درجة حرارة.....

(أ) أقل من 100°C (ب) أكبر من 100

(ج) تساوي 100°C (د) أكبر من 200

13) انخفاض في ضغط بخار السائل للمحلول يتناسب..... مع عدد الجزيئات أو أيونات المذاب في

المحلول

(أ) طرديا (ب) عكسيا (ج) تناقصيا (د) لا يمكن تحديد الإجابة

14) أي مما يلي لا يعد من الخواص الجمعيه للمحاليل

أ. ضغط بخار السائل ب. درجة الغليان ج. درجة التجمد د. درجة الانصهار

15)..... درجة غليان الماء عند الارتفاعات العالية

أ. تزيد ب. تقل ج. لا تتأثر د. تتضاعف

16) درجة الحرارة التي يتحول عندها السائل إلى صلب.

أ. درجة الغليان ب. درجة الانصهار ج. درجة التجمد د. درجة التكثف

17) كيف يؤثر تركيز المواد المذابة على كثافة الماء؟

(أ) يقلل الكثافة (ب) لا يؤثر (ج) يزيد الكثافة (د) يغير اللون فقط

18) ما هي درجة غليان السائل النقي تحت الضغط الجوي؟

(أ) 0 درجة مئوية (ب) 50 درجة مئوية

(ج) 100 درجة مئوية (د) 200 درجة مئوية

19) لماذا يتم رش الملح على الطرق في المناطق الباردة؟

(أ) لتحسين المظهر (ب) لزيادة تجمد الماء

(ج) لتنظيف الطريق (د) لتقليل تجمد الماء

20) ما هي العلاقة بين تركيز المواد المذابة وحركة التيارات المائية؟

(أ) زيادة التركيز تزيد الحركة (ب) لا توجد علاقة

(ج) تزيد الحركة في حالة التركيز المنخفض (د) التركيز العالي يقلل الحركة

21 العامل الأساسي الذي يحدد اتجاه حركة الماء في الظاهرة الأسموزية؟

- (أ) حجم جزيئات الماء
(ب) اختلاف تركيز المادة المذابة بين المحلولين.
(ج) درجة حرارة المحلولين
(د) نوع الغشاء الفاصل بين المحلولين.

22 عند وضع محلولين مختلفي التركيز يفصل بينهما غشاء شبه منفذ، أي العبارات التالية تصف حركة الماء بشكل صحيح؟

- (أ) ينتقل الماء من المحلول ذي الضغط الأسموزي المرتفع إلى المنخفض.
(ب) ينتقل الماء من المحلول المركز إلى المحلول المخفف.
(ج) ينتقل الماء من المحلول ذي الضغط الأسموزي المنخفض إلى المرتفع.
(د) لا تحدث أي حركة للماء.

23 أي من المواد التالية يُتوقع أن يمنع الغشاء شبه المنفذ مرورها خلال عملية الأسموزية؟

- (أ) جزيئات الماء الصغيرة
(ب) أيونات المعادن الصغيرة.
(ج) جزيئات السكر الكبيرة
(د) جميع ما سبق

24 ما هي العلاقة بين تركيز المحلول والضغط الأسموزي؟

- (أ) المحلول الأعلى تركيزًا له ضغط أسموزي منخفض.
(ب) لا توجد علاقة مباشرة بين التركيز والضغط الأسموزي.
(ج) المحلول الأقل تركيزًا له ضغط أسموزي أعلى.
(د) المحلول الأعلى تركيزًا له ضغط أسموزي أعلى.

اسئله مقالیه

1. ما هو المحلول المائي؟ وما الفرق بين المذيب والمذاب؟

المحلول المائي هو خليط متجانس يتكون من مذيب ومذاب، حيث يكون المذيب هو الماء. المذيب هو المادة الموجودة بنسبة أكبر والتي تقوم بإذابة المادة الأخرى، وهو في هذه الحالة الماء. أما المذاب فهو المادة التي يتم إذابتها في المذيب، ويمكن أن يكون مادة كيميائية مثل الأملاح أو السكر.

2. كيف يؤثر تركيز المادة المذابة على كثافة الماء؟ وما هي النتائج المترتبة على ذلك؟

الإجابة:

كلما زاد تركيز المواد المذابة في الماء، زادت كثافة الماء. هذه الزيادة في الكثافة تؤدي إلى: تغيرات في التيارات المائية، وخاصة التيارات الرأسية.

تؤثر على توزيع الكائنات الحية عند مختلف الأعماق، حيث يمكن أن تحمل هذه التيارات الكائنات الحية إلى أعماق مختلفة أو إلى سطح الماء.

3. ما هي الخواص الجمعية للمحاليل ؟ و اذكر امثله

الإجابة:

الخواص الجامعة هي خواص المحلول التي تعتمد على عدد جسيمات المذاب أو أيونات المادة المذابة في المحلول، وليس على نوع هذه الجسيمات.

أمثلة على الخواص الجامعة الأربعة هي:

الانخفاض في ضغط بخار السائل.

الارتفاع في درجة الغليان.

الانخفاض في درجة التجمد.

الضغط الإسموزي.

4. لماذا يكون الضغط البخاري للماء النقي أعلى من الضغط البخاري للمحلول؟

الإجابة:

يكون الضغط البخاري للماء النقي أعلى لأن:

في الماء النقي، تكون جزيئات الماء على السطح قابلة للتحرر والتحول إلى بخار بسهولة نسبية بسبب قوى التجاذب بين جزيئات الماء نفسها (بما في ذلك الروابط الهيدروجينية).

في المحلول، توجد قوى تجاذب إضافية بين جزيئات الماء وجزيئات المذاب. هذه القوى تكون أقوى من قوى التجاذب بين جزيئات الماء وبعضها البعض.

نتيجة لذلك، تصبح جزيئات الماء مرتبطة بقوة أكبر في المحلول، مما يقلل من احتمالية تبخرها، وبالتالي ينخفض ضغط البخار.

5. قارن بين درجة غليان الماء النقي ودرجة غليان المحلول عند نفس الضغط الجوي، مع التعليل.
الإجابة:

درجة غليان المحلول أعلى من درجة غليان الماء النقي عند نفس الضغط الجوي.
السبب: وجود قوى الترابط بين جزيئات المذاب والمذيب (جزيئات الماء) في المحلول، مما يؤدي إلى الحاجة إلى طاقة أكبر (درجة حرارة أعلى) لتبخير جزيئات الماء وكسر هذه الروابط الإضافية.
6. اذكر تطبيق عملي لظاهرة الانخفاض في درجة تجمد المحلول؟
الإجابة:

من التطبيقات العملية: رش كميات من الملح على الطرق في المناطق الباردة بعد سقوط الأمطار.
طريقة العمل: يذوب الملح في ماء المطر مكوناً محلولاً ملحيًا. درجة تجمد هذا المحلول الملحي أقل من درجة تجمد الماء النقي. لذلك، تقل كمية الجليد المتكونة على الطرق، مما يقلل من انزلاق السيارات ويحد من وقوع الحوادث.
7. عرّف كلاً من الأسموزية والضغط الأسموزي. وما هو اتجاه حركة الماء خلال الغشاء شبه المنفذ؟
الإجابة:

الأسموزية: هي ظاهرة فيزيائية طبيعية يتم فيها انتقال جزيئات الماء من المحلول الأقل تركيزاً (المخفف) إلى المحلول الأعلى تركيزاً (المركز) عبر غشاء شبه منفذ.
الضغط الأسموزي: هو الضغط الذي ينشأ بسبب اختلاف تركيز المادة المذابة بين محلولين، ويمكن اعتباره "القوة" التي تدفع الماء للتحرك.
اتجاه حركة الماء: دائماً ما ينتقل الماء من منطقة الضغط الأسموزي المنخفض (المحلول المخفف) إلى منطقة الضغط الأسموزي المرتفع (المحلول المركز).

كيفية طباعة صفحات معينة من ملف معين مثلا ازاي نطبع الصفحات من صفحة 4 الى صفحة 9

